



Mirador[®]

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l)

ADAMA

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.
Agítese antes de usar.

5 Litros

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN

Ver marcado impreso

Mirador®

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l)

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos • Mantener fuera del alcance de los niños • No comer, beber ni fumar durante su utilización • Evitar su liberación al medio ambiente • Recoger el vertido • Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • Puede provocar sensibilización • Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos • Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar • No administre nada por vía oral • En caso de ingestión, NO provoque el vómito • Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración • Mantenga al paciente en reposo • Conserve la temperatura corporal • Controle la tensión arterial • Controle

la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Valorar la realización de endoscopia digestiva • Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase • **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Aplicación mediante tractor y manual, debiendo utilizar el aplicador guantes en las operaciones de mezcla/carga, así como ropa de protección para el tronco y las piernas.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m. hasta las masas de agua superficial.

En prevención de riesgos para organismos acuáticos se recomienda: no utilizar en campos inundados, reintroducir el agua después de 3 ó 4 días de la aplicación. El plazo de retención de agua en campo tratado, será como mínimo de 10 días.



ATENCIÓN

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n° 22.000
por Syngenta España, S.A.

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta
28045 Madrid - Tel.: 91 585 23 80



Mirador®

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l)

PLAZO DE SEGURIDAD

Fresa, pepino, calabacín, pepinillo: 1 día • Tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, calabaza: 3 días • Lechuga y similares (achicoria, berros, canónigos, endibia y escarola), alcachofa, apio, judía verde, zanahoria, perejil: 7 días • Ajo, cebolla, coliflor, coles de Bruselas, repollo, brécol, guisante verde, guisante para grano: 14 días • Puerro: 15 días • Arroz, judía para grano: 28 días • Trigo, cebada: 35 días • Espárrago y caqui: No procede.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta dirijase a nuestro Servicio Técnico.



GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n° 22.000
por Syngenta España, S.A.

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta
28045 Madrid
Tel.: 91 585 23 80

Mirador es una marca registrada
por una compañía del grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

ES160987AG-R6



Mirador®

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l)

ADAMA

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.
Agítese antes de usar.

5 Litros

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN

Ver marcado impreso

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Azoxistrobin 25% p/v (250 g/l)

APLICACIONES AUTORIZADAS

Tomate: Oidio, mildiu, alternaria, cladosporiosis.

Pimiento y berenjena: Oidio y mildiu.

Melón, sandía, pepino, calabacín, calabaza y pepinillo: Oidio, mildiu, didimella.

Fresa: Oidio.

Caqui: Mancha foliar.

Lechuga y similares (achicoria, berros, canónigos, endibia y escarola): Esclerotinia, mildiu, oidio.

Alcachofa: Oidiopsis, mildiu.

Apio: Cercospora, septoria.

Ajo, cebolla y puerro: Roya, mildiu, alternaria.

Coliflor, coles de Bruselas, repollo: Alternaria, micosphaerella.

Brécol: mildiu.

Judía verde y para grano: Roya.

Guisante verde: Antracnosis, oidio, roya y botritis.

Guisante para grano: Botritis.

Espárrago: Roya, Stemphylium.

Zanahoria: Alternaria, oidio.

Perejil: Mildiu, septoria.

Trigo: Septoria, roya, oidio, helmintosporium.

Cebada: Septoria, roya, oidio, helmintosporium, rincosporium.

Arroz: Helmintosporium y piricularia.

DOSIS

Tomate, pimiento, berenjena: 80-100 cc/hl • Melón, sandía, pepino, calabacín, calabaza, pepinillo: 75-80 cc/hl • Fresa: 100 cc/hl • Caqui: 50-100 cc/hl con un máximo de 1 l/ha • Lechuga y similares (achicoria, berros, canónigos, endibia y escarola), judía verde, judía para grano, guisante verde, guisante para grano, alcachofa, espárrago, apio, ajo, cebolla, zanahoria: 80-100 cc/hl (0,8-1,0 l/ha) • Trigo, cebada, puerro, perejil, coliflor, coles de Bruselas, repollo, brécol: 0,8-1,0 l/ha • Arroz: 1,0 l/ha.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar con suficiente cantidad de agua para asegurar un buen recubrimiento del cultivo, mediante pulverización a alta presión para conseguir un tamaño de gota fina. Se recomienda el uso de boquillas finas de máximo 1,2 y preferiblemente de turbulencia.

Los tratamientos se realizarán preventivamente o al inicio de la enfermedad, pudiéndose repetir el tratamiento cada 10-12 días en tanto persisten las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. Excepto, en trigo y cebada que la aplicación se realizará a la aparición de la enfermedad para mantener sanas las 2 hojas superiores, en el cultivo del espárrago que se tratará en ausencia de turiones, en el cultivo del perejil que el intervalo entre tratamientos será de 7-10 días y el cultivo del caqui que el intervalo será de 15 días desde la aparición de los brotes hasta la caída de los pétalos.

Los tratamientos en apio, lechugas y similares se realizarán en cultivos al aire libre.

La aplicación en arroz se realizará entre la prefloración y el principio del espigado. No se utilizará Azoxistrobin 25SC dos campañas seguidas, se recomienda la rotación con otros fungicidas con diferente modo de acción.

Realizar un único tratamiento por campaña en cereales (trigo, cebada). En el resto de los cultivos, se recomienda realizar 2 aplicaciones seguidas. En brécol realizar un máximo de 2 aplicaciones.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	11	FUNGICIDA
-------	----	-----------

OBSERVACIONES

El mejor comportamiento del producto se produce cuando se aplica solo, sin mezclas de ningún tipo. En ningún caso se recomienda la adición de Mojantes, abonos foliares y productos que contengan Abamectina. Antes de realizar un tratamiento en mezcla con otros productos deberá realizarse una pequeña prueba previa a la aplicación, para comprobar la bondad de la mezcla y/o consultar con el servicio técnico de la empresa. Esto es especialmente recomendable cuando se mezcle con concentrados emulsionables (EC).

Se recomienda no utilizar fungicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña.