

# Elios

## Fungicida

**Características:** Elios combina la actividad sistémica de Metalaxil y preventiva de Mancozeb frente a Mildiu (*Plasmopara viticola*) en vid; mildiu (*Phytophthora infestans*) en tomate y berenjena en campo e invernadero; mildiu (*Phytophthora infestans*) y alternaria (*Alternaria solani*) en patata y moho azul (*Peronospora hyoscyami*) en tabaco.

**Composición:** Metalaxil 8% p/p (80 g/kg) y Mancozeb 64% p/p (640 g/kg)

**Formulación:** Polvo mojable.

**Nº de Registro:** 23.088

### USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	VOLUMEN DE CALDO l/ha	PLAZO DE SEGURIDAD
VID	Mildiu	2,5	400-1000	28
TOMATE Y BERENJENA	Mildiu	2,5	400-1000	21
PATATA	Mildiu, alternaria	2,5	400-1000	21
TABACO	Moho azul	2,5	400-1000	21

### MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor, manual con lanza o pistola y mochila en todos los usos autorizados al aire libre. Para los usos autorizados en invernadero aplicar mediante pulverización manual con lanza o pistola y mochila.

Aplicar un volumen de pulverización suficiente para cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen necesario dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del estado de desarrollo del follaje.

La lluvia o el riego en las 2 horas posteriores a la aplicación pueden reducir la eficacia.

### CONDICIONES DE USO

-Vid:Realizar 1-2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días.

Aplicar desde la cuarta hoja desplegada hasta comienzo de la maduración; las bayas comienzan a brillar (BBCH 14-81). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo

- Tomate y berenjena:Realizar 1-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días.

Aplicar desde la cuarta hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta el 70% de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH 14-87).

La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo

\_ Patata:Realizar 1-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar desde la cuarta hoja del tallo principal desplegada hasta fin de floración (BBCH 14-69). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo

- Tabaco:Realizar 1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar desde la segunda hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta madurez completa (BBCH 12-89). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo

Clasificación Toxicológica



DISTRIBUIDO POR

**BRANDT**®

BRANDT EUROPE, S.L.

Ctra. Carmona - Guadajoz Km 3.1

41410 Carmona (Sevilla)

Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

[www.brandteurope.com](http://www.brandteurope.com)