Perfectose®

Aminoácidos
Energía para tus cultivos

Capacidad 5 l | 25 l | 1000 l

Composición	Ver descripción del producto
Formulación	(SL) - Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS

Producto procedente de la hidrólisis de extractos vegetales, que asegura un máximo contenido en isómeros L, únicos aminoácidos biológicamente activos. Debido al elevado contenido en aminoácidos libres y su rápida incorporación a la savia elaborada de las plantas, proporciona un medio nutritivo aprovechado de forma inmediata y efectiva por las plantas. Favorece todos los procesos vegetativos: crecimiento, inducción floral, cuajado y desarrollo de los frutos. Contiene substancias complejantes que favorecen la absorción de sus micronutrientes asi como de los del propio suelo.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Evitar aplicar el producto en caldos de pH superior a 10. No aplicar con altas temperaturas (>30° C). Se puede mezclar con la mayoría de abonos foliares y fitosanitarios. No mezclar con aceites, azufre o con fitorreguladores si no se tiene experiencia en cuanto a la respuesta a obtener. Así mismo no es recomendable la mezcla con más de dos productos distintos, aunque sean compatibles. En cualquier caso se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Conservar el producto en su envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y 40°C.

ÉPOCA DE EMPLEO

Depende directamente del cultivo a tratar y del motivo de la aplicación. Consultar la etiqueta.

CONTENIDO DECLARADO

- Aminoácidos libres 10,5% p/p
- Nitrógeno (N) total 6,6% p/p
- Nitrógeno (N) orgánico 3,0% p/p
- Nitrógeno (N) amoniacal 3,6% p/p
- Aminograma: Ácido aspártico, Ácido glutámico (73% p/p), Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina.

CLASIFICACIÓN Y SEGURIDAD

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

Cultivo	Efectos	Época de aplicación	Dosis y modo de empleo
Cítricos	Estimula la brotación e inducción floral. Acelera el desarrollo de los brotes. Mejora el cuajado, desarrollo y calibre de los frutos.	Comenzar las aplicaciones al inicio de la brotación y continuar las aplicaciones durante todo el proceso vegetativo.	Plantones: 5 cc/árbol y mes repartidos en varios riegos. Árboles jóvenes: 10 - 15 cc/árbol y mes repartidos en varios riegos. Árboles adultos: 15 - 20 cc/árbol y mes repartidos en varios riegos, hacer coincidir la aplicación con las tres brotaciones principales.
Frutales de hueso (Incluido el albaricoquero)	Proporciona una brotación más regular. Viste mejor el árbol.	Al inicio de la brotación junto con el quelato de hierro FERRALE EVO.	En árboles en producción, aplicar 40 cc/pie repartidos en varios riegos durante el primer mes, repetir las aplicaciones en caso de pretender estimular o alargar los brotes.
	Aumenta el calibre. Mejora la coloración.	Al inicio del cambio de color.	Aplicar 40 cc/pie desde el cambio de color al fin de la recolección, es conveniente aplicar junto con LIQUI-K.
			n albaricoque aumentar las dosis según el porte del árbol.
Frutales de pepita	Estimula la brotación.	Desde yema hinchada hasta plena floración.	120 cc/árbol. Repartidos en varios riegos durante los periodos señalados.
	Aumenta el calibre.	Desde el fruto cuajado hasta la maduración.	60 cc/árbol. Repartidos en varios riegos durante los periodos señalados.
Uva de mesa	Estimula la brotación.	Aplicar al inicio de la brotación.	Aplicar un mínimo de 20 cc/parra o cepa junto con el quelato de hierro FERRALE EVO durante el primer mes del ciclo vegetativo.
	Mejora el desarrollo del racimo asegurando el aporte de nutrientes.	Después del cuajado.	Aplicar 25 cc/parra o cepa junto con el quelato de hierro FERRALE EVO.
Olivo	Alarga las brotaciones.	Plantones: Durante todo el periodo vegetativo.	Repartir 30 – 40 cc/árbol durante todo el periodo vegetativo.
	Favorece la metida (alarga y fortalece las brotaciones). Mejora el cuajado. Evita la caída de frutos jóvenes.	1- Al inicio de la brotación. 2- Al inicio de la floración. 3- Frutos del tamaño de un guisante.	Aplicar, en cada uno de los momentos indicados, la siguiente dosis repartida en el riego. Árboles jóvenes: 30 - 40 cc/árbol. Árboles adultos: 40 - 60 cc/árbol.
Tomate y pimiento	Mejora el arraigo y favorece la vegetación.	Desde el trasplante hasta la floración del primer ramillete.	Repartir de 10 a 20 l/ha en 3 - 5 riegos.
	Mejora el cuajado.	Desde el cuajado del primer ramillete y siguientes.	Aplicar, para cada ramillete, de 10 a 20 l/ha repartidos en dos riegos.
Tomate de industria	Estimula la vegetación, cuajado y calibre.	1- Crecimiento vegetativo. 2- Inicio de la floración. 3- Crecimiento del fruto.	Aplicar un total de 5-10 l/ha divididos en 2-3 riegos.
Cucurbitáceas	Mejora la vegetación.	En estado de 3 - 4 hojas.	Aplicar 3 l/ha repartidos en varios riegos a partir del momento indicado.
	Mejora la floración, cuajado y desarrollo de los frutos.	Comienzo de la floración, cuajado y engorde.	Aplicar 10 - 15 l/ha repartidos en varios riegos.
Fresón	Favorece la vegetación. Mejora el cuajado.	Durante todo el periodo vegetativo.	Realizar varias aplicaciones a 5 l/ha cada una de ellas.

Lechuga, apio y brassicas	Favorece al arraigue. Estimula la vegetación.	Durante todo el ciclo de cultivo.	Aportar 5 l/ha cada semana.
Alcachofa	Acelera el crecimiento vegetativo.	Durante todo el periodo vegetativo.	Aportar 10 - 15 l/ha por aplicación en 3 a 4 riegos.
Cebolla, puerro y ajo	Mejora la vegetación. Favorece la formación del bulbo.	A los 8 - 10 cm de altura. 2 aplicaciones más a 20 días de intervalo.	Aplicar 5 l/ha por riego.
Patata	Aumenta la producción. Regula los calibres.	Comenzar la aplicación a los 30 días de la emergencia.	Aplicar 2 - 3 veces desde el momento indicado al final del periodo vegetativo a 10-15 l/ha por riego.
Algodón	Estimula el desarrollo. Favorece el cuajado.	En el caso de bajas temperaturas.	Aplicar a 10 l/ha.
		Al inicio de la floración y repetir 2-3 veces con 15 días de intervalo.	Aplicar de 5 a 10 l/ha en cada riego.
Tabaco	Estimula la vegetación.	Primer riego de trasplante.	Aplicar 0,5 cc/planta.
	Facilita la formación de la hoja. Fortalece la planta frente a ataques de nematodos.	Cada 15 días a lo largo de todo el ciclo, con un mínimo de 4 aportaciones.	Aplicar 0,2 cc/planta y riego.
Legumbres forrajeras	Estimula la vegetación. Facilita el cuajado. Mejora el contenido de proteínas.	Formación de la 3ª hoja foliada: tres aplicaciones con 20 días de intervalo.	Aplicar 5 – 10 l/ha.
Judía verde y guisante	Favorece la vegetación. Incrementa el cuajado. Facilita la formación de vainas y granos.	A la aparición de los primeros botones florales y cada 20 días (con un mínimo de 3 aplicaciones).	Aplicar, en cada riego, 2 l/ha.
Platanera	Favorece el desarrollo vegetativo y la formación de hijos. Estimula el crecimiento del fruto.	A lo largo de todo el ciclo de cultivo.	Aportar un total de 50 cc/planta y ciclo, fraccionando esta dosis en aplicaciones semanales de 4-5 cc/planta.