

HerbicidaCapacidad 1l 5l**Biwax[®] 5**

Composición	Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (5,26% p/p)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	24.812

CARACTERÍSTICAS

Herbicida selectivo, sistémico, a base de Quizalofop-p-etil recomendado para el control de malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia precoz. Se caracteriza por ser absorbido por las hojas y translocado por toda la planta, con movimiento en el xilema y floema y acumulación en los tejidos meristemáticos. Quizalofop es una sustancia activa del grupo de los ariloxifenoxipronatos que actúa como inhibidor del acetyl CoA carboxilasa e impide la biosíntesis de los ácidos grasos.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 300-400 l/ha. En la aplicación del producto deben tomarse precauciones para que la deriva de la pulverización no alcance cultivos de cereales colindantes.

Esperar 3 meses antes de sembrar cereales en parcelas tratadas con BIWAX® 5. Alternar productos con diferente modo de acción en caso de que para el control de las malas hierbas se requiera repetir el tratamiento. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas, forestales) no destinados al público en general. Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

ÉPOCA DE EMPLEO

Realizar una única aplicación por campaña en post-emergencia del cultivo.

Aplicaciones autorizadas	Dosis	Forma y época de aplicación (Condic. específico)	Plazos de seguridad (días)	
Cítricos	Gramíneas anuales 1 - 2 l/ha Gramíneas vivaces 1 - 3 l/ha	Aplicar desde primeras hojas visibles (BBCH 12) hasta fin de la floración (BBCH 69).	35	
Frutales de hueso (melocotonero, albaricoquero, ciruelo y cerezo)		Aplicar desde primeras hojas desplegadas (BBCH 12) hasta estadio de balón del órgano floral (BBCH 59).	35	
Frutales de pepita (manzana, pera, nispero y membrillero)			35	
Frutales de cáscara (almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño y pacana o nuez de pecán)			35	
Fresales			42	
Girasol		Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH 12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH 39).	45	
Garbanzo, guisante para grano y verdes, judías para grano y verdes, lentejas			54	
Ajos, Cebolla			55	
Patata, Tomate y Berenjena			56	
Remolacha azucarera			60	
Algodonero, Colza, Lino, Soja			90	
Forestales Ornamentales herbáceas Ornamentales leñosas			NP	
Alfalfa, tabaco, Trébol y Veza			21	
Vid	Gramíneas anuales y vivaces 1 - 2 l/ha		Aplicar desde 2 hojas desplegadas (BBCH 12) hasta inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH 57).	35