



Insecticida de contacto.

Capacidad



Composición	Aceite de Parafina 83% p/v (830 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	22 319

CARACTERÍSTICAS

Actúa por contacto y penetra en las tráqueas de los insectos provocando la muerte por asfixia.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Debe emplearse en pulverización normal terrestre sobre el cultivo, dosificando en el tanque de pulverización la cantidad adecuada de producto y añadiendo la cantidad de agua adecuada, agitando continuamente hasta su perfecta homogenización. El éxito del tratamiento dependerá fundamentalmente de la distribución uniforme sobre el cultivo.

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola.

En cerezo, frutales de hueso y plantas herbáceas observar precauciones por la fitotoxicidad del producto.

No se debe mezclar con CAPTAN, DINOCA y FOLPET ya que puede resultar fitotóxico. No aplicar conjuntamente con compuestos derivados del AZUFRE o con CLORTALONIL: entre la aplicación del AZUFRE y el producto o viceversa deben transcurrir, al menos, 40 días, y al menos, 30 días entre la del producto y la de CLORTALONIL o viceversa.

Tomar precauciones si se pretende aplicar otros productos cuya mezcla no sea conocida. Realizar una prueba específica de compatibilidad en dicho caso.

ÉPOCA DE EMPLEO

No aplicar este producto cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos.

- Cítricos: aplicar antes del cambio de color de los frutos.
- Frutales de hueso y pepita, platanera: aplicar antes de que se inicie la maduración del fruto.
- Olivo: aplicar en verano.
- Ornamentales leñosas: aplicar en cualquier estadio de desarrollo.

Cultivo	Plaga	Momento de aplicación	Dosis %	Nº Aplic. (intervalo)	Vol. Caldo (l/ha)	PS
Cítricos (limonero, mandarino, clementino, naranja y pomelo)	Cochinillas, mosca blanca y pulgón	Aplicar antes del cambio de color de los frutos	1 - 1,5 (20 - 45 l/ha)	1 - 2 (10 días)	2000 - 3000	NP
Frutales de hueso (albaricoquero, cerezo, melocotonero, nectarino y ciruelo)	Pulgón y cochinilla	Aplicar antes de que se inicie la maduración del fruto	0,75 - 1 (6-10 l/ha)	1	800 - 1000	NP
Frutales de pepita (manzano, peral, membrillero y nispero)						
Aguacate*	Cochinillas y arañas	Aplicar antes del BBCH 81 (coloración del fruto)	1 - 1,5 (20-45 l/ha)	1 - 2 (10 días)	2000 - 3000	NP
Almendro*, anacardos*, avellano*, castaño*, cocos*, macadamias*, nogal*, nueces del Brasil*, pacanas*, pino piñonero* y pistacho*	Arañas, pulgones y cochinillas	Aplicar antes del inicio de la maduración del fruto	0,75 - 1 (6 - 10 l/ha)	1	800 - 1000	NP
Olivo	Cochinillas	Aplicar en verano	1 - 1,5 (7,5-15 l/ha)	1	750 -1000	NP
Ornamentales leñosas		Aplicar en cualquier estadio de desarrollo				
Platanera	Cochinilla, araña roja, mosca blanca y pulgón	Aplicar antes que se inicie la maduración del fruto	1 - 1,5 (15-37,5 l/ha)	1	1500 - 2500	NP

PS - Plazo seguridad. NP - No procede

*Usos menores: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51 Reglamento (CE) 1107/2009). La responsabilidad en relación con la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.