MASSÓ AGRO DEPARTMENT

HERBICIDA SELECTIVO POLIVALENTE

ACTIVUS®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION: PENDIMETALINA 33% p/v (330 g/l)

Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6)

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº. 22.846.

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

CONTENIDO NETO: 5 litros

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN: VER MARCADO IMPRESO

V.2

www.massoagro.com

PELIGRO

H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superfícies calientes. No fumar. P261 Evitar respirar los vapores. P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P301+P330+P331 En caso de ingestión no provocar el vómito. P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. P403+P233 Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P403+P235 Mantener en lugar fresco. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo químico o espuma para apagarlo. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Elimínese su contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa de residuos peligrosos. EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. / Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. / Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. / Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. / No administrar nada por vía oral. / En caso de ingestión, no provoque el vómito. / Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración. Irritación pulmonar. / Mantenga al paciente en reposo. / Conserve la temperatura corporal. / Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. / Puede provocar alteraciones cardíacas. / Puede provocar depresión del SNC. / Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. / Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. / Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono. 91 562 04 20.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta las masas de agua superficial.

Para proteger las plantas no objeto de tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavabo al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

APLICACIONES AUTORIZADAS: Trigo, cebada, maíz, patata, girasol, alcachofa, soja, algodón, frutales de hoja caduca, cítricos, zanahoria, ajo, cebolla, tomate, pimiento, repollo, brécol, coliflor, lechuga, guisantes verdes, judías y habas para grano, puerro, garbanzo, fresales, tabaco, viveros y vid, contra malas hierbas anuales en preemergencia o postemergencia precoz de las mismas (hoja ancha y gramíneas).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, con incorporación y el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas. En todos los casos no superar la dosis máxima de producto en una única aplicación por campaña.

CULTIVOS	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS	P.S. (días)
Ajos	Aplicar en preemergencia o postemergencia temprana (1-3 hojas).	4-6 l/ha	NP
Alcachofa	Aplicar en pretransplante.	3-5 l/ha	90
Algodonero	Aplicar en presiembra o preemergencia.	4-6 l/ha	NP
Brécol, Coliflor, Repollo	Aplicar solo al aire libre en pretrasplante.	3-5 l/ha	90
Tomate, Pimiento, Lechuga	Aplicar solo al aire libre en pretrasplante.	3-5 l/ha	NP
Cebada, Girasol, Guisantes verdes, Patata, Trigo	Aplicar en preemergencia del cultivo.	4-6 l/ha	NP
Cebolla	Aplicar en pre o postemergencia, hasta 3 hojas, o pretransplante.	3-5 l/ha	NP
Cítricos, Frutales de hoja caduca	Dirigido al suelo antes de que emerjan las malas hierbas.	4-6 l/ha	NP
Fresales	Aplicar en pretransplante.	4-6 l/ha	NP
Garbanzo, Habas para grano, Puerro, Zanahoria	Aplicar en preemergencia del cultivo.	4-6 l/ha	NP
Judías para grano, Soja	Aplicar en presiembra del cultivo.	4-6 l/ha	NP
Maíz	Aplicar en pre o postemergencia del cultivo hasta 2 hojas.	4-6 l/ha	NP
Tabaco	Aplicar en pre o postransplante a una dosis de 4-6 l/ha. Para deshijado del tabaco aplicar al aparecer las primeras flores, con un gasto de 23,5 cc/planta y una dosis de 8,5 cc por cada litro de agua.		Deshijado: 21 días Resto: NP
Vid	Tratamiento dirigido al suelo durante la parada invernal, en estado de yema dormida.	4-6 l/ha	NP
Viveros	Aplicar en pre o post-plantación de las estacas.	4-6 l/ha	NP

PRECAUCIONES: Para obtener los mejores resultados debe usarse en suelos bien preparados, desprovistos de terrones, desperdicios, restos vegetales o de malas hierbas bien arraigadas. Las labores de aporcado llevadas a cabo después de la emergencia del cultivo, pueden reducir su eficacia. Por tanto, estas labores deben llevarse a cabo antes de la aplicación del herbicida. No controla malas hierbas perennes.

Cultivos sensibles: La persistencia del producto en el suelo es del orden de 3 meses. Los siguientes cultivos son particularmente sensibles: Remolacha azucarera y de mesa, espinacas, acelgas, melón y sandía.

Cultivos siguientes o alternativa: Los intervalos de tiempo entre su empleo y la siembra de un determinado cultivo son: soja, judías, guisantes, pimiento, tabaco, cebollas de transplante, algodón, ajos y girasol, pueden ser sembrados inmediatamente después, previa labor de 15 a 20 cm de profundidad. Intervalo de 3 meses para sembrar patatas, previa labor de 15 a 20 cm de profundidad. Intervalo de 6 meses precedida la siembra de una labor de 15 a 20 cm de profundidad, para sembrar maíz, trigo, sorgo, melón, lechuga de siembra directa y remolacha azucarera y de mesa.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC: GRUPO 3 HERBICIDA

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: El aplicador debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo, mascarilla FFA2P3 durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas durante la aplicación (tipo 6 en aplicaciones con tractor y tipo 4 en aplicaciones manuales). No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Se recomienda la utilización de guantes, ropa y calzado adecuado cuando se entre en contacto con el terreno tratado. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Producto distribuido por: MASSÓ

COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5ª - 08029 BARCELONA - Tel. 93 495 25 00
Fax 93 495 25 02 - E-mail: masso@cqm.es - www.massoagro.com

MM-06/15

V.2