

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

WELGRO® POTASIO

NÚMERO DE REGISTRO

No procede – ABONO CE

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total.....	0% p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅).....	17% p/p
Óxido de potasio (K ₂ O).....	43% p/p
Boro (B) soluble en agua.....	0,02% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua.....	0,13% p/p
Hierro (Fe) quelatado con EDTA.....	0,13% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua.....	0,05% p/p
Manganeso (Mn) quelatado con EDTA.....	0,05% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua.....	0,005% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua.....	0,06% p/p
Zinc (Zn) quelatado con EDTA.....	0,06% p/p

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada: 3-6

FORMULACIÓN

Cristales soluble en agua.

CARACTERÍSTICAS

ABONO PK 17-43 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)

WELGRO®POTASIO es un fertilizante totalmente soluble en agua que se aplica en pulverización foliar. Puede aplicarse a cualquier cultivo, pero está especialmente recomendado en los exigentes en potasio, como frutales, cítricos, vid, olivo, patata, remolacha y hortalizas de fruto.

WELGRO®POTASIO mejora la calidad, color, tamaño y características organolépticas de los frutos y, cosa muy importante, aumenta el contenido en azúcares de la uva y otros frutos así como de la remolacha.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 20kg.

APLICACIONES RECOMENDADAS Y DOSIS

WELGRO®POTASIO se aplica a la dosis general de 150-250 g/hl en frutales, cítricos y hortalizas.

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES PARTICULARES:

Tomate: 1-2 tratamientos después del cuajado de cada ramillete floral a la dosis de 150-250 g/hl. En fertirrigación puede aplicarse durante la fructificación y maduración a 3-5kg/ha, semanalmente.

Patata: 2 tratamientos al inicio de la tuberización y 30-45 días después a la dosis de 2-2,5 kg/ha

Remolacha: 2 tratamientos 45 días antes de la cosecha y 15-21 días antes de la misma a 2 kg/ha.

Vid (especialmente para vinificación): 2-4 tratamientos desde el cierre del racimo hasta la maduración a 2-4kg/ha.

Olivo: aplicar des del endurecimiento del hueso hasta la maduración a dosis de 0,5-1 kg/hl.

COMPATIBILIDAD

WELGRO®POTASIO puede mezclarse con la mayoría de los productos agroquímicos utilizados en los cultivos que se recomienda. En caso de duda consultar a COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÒGICA



PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P280 Llevar guantes.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.

P401 Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente