



ATENCIÓN

- Provoca irritación ocular grave (H319).
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H410).
- **A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso** (EUH 401).
- Evitar respirar el polvo y la niebla (P261). - Llevar gafas y máscara de protección (P280). - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando (P305+P351+P338).
- Evitar su liberación al medio ambiente (P273). - Recoger el vertido (P391). - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos (P501).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Medidas básicas de actuación: • Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO** La intoxicación puede provocar: • Irritación de ojos, tracto respiratorio y gastrointestinal. • Alteraciones cardíacas Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: • En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. • Tratamiento sintomático. **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91 562 04 20.** En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación: El aplicador debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga del producto y limpieza del equipo, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas. No realizar actividades que impliquen el contacto con el área o cultivo tratado hasta que el producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación. Lávese toda la ropa de protección después de usarla (SPo 2).

Mitigación de riesgos medioambientales: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial (SPe 3). Para proteger las plantas no objeto de tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada (SPe 3). **NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.** No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.



Dow AgroSciences

Intensity®

HERBICIDA

Granulado dispersable en agua (WG)

INTENSITY es un herbicida de post-emergencia selectivo para trigo y cebada, con una alta eficacia sobre malas hierbas de hoja ancha

Composición: Florasulam 150 g/kg (15% p/p)
Aminopiraldil sal potásica 300 g e.a./kg (30% p/p)

Contenido neto: 165 g e

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO,
LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
Uso Reservado para Agricultores y
Aplicadores Profesionales

Inscrito en el R.O.P.F. N° 25.116 por:
Dow AgroSciences Ibérica, S.A
c/Ribera del Loira 4-6, 4ª pl.
28042 MADRID Tel. 91 7407700
www.dowagrosciences.es

31-MAR-15

INTENSITY® es un herbicida selectivo para trigo y cebada, que se aplica en post-emergencia con alta eficacia en un amplio espectro de malas hierbas de hoja ancha, incluida amapola y sus biotipos.

INTENSITY se absorbe rápidamente por las hojas y en menor medida por las raíces. Después de la aplicación se detiene el crecimiento de la mala hierba, los primeros síntomas aparecen de 5 a 10 días después y la eficacia máxima se obtiene al cabo de 6 a 8 semanas.

CULTIVOS AUTORIZADOS

INTENSITY puede usarse en todas las variedades de trigo y cebada.

MALAS HIERBAS CONTROLADAS

Papaver rhoeas y sus biotipos (Amapola), *Sinapis arvensis* (Jaramagos, Amarillas), *Galium aparine* (Lapa), *Matricaria* spp. (Margarita, Magarzas), *Chrysanthemum* spp. (Margaritón), *Polygonum aviculare* (Cien nudos) y *Cirsium arvense* (Cardos).

DOSIS DE USO

INTENSITY se aplica a la dosis de 25 a 33 gramos de producto por hectárea. La adición de un mojante autorizado puede mejorar la eficacia del producto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar **INTENSITY** en pulverización con tractor desde el estadio de 3 hojas hasta el inicio del encañado (BBCH 13 a BBCH 31), siendo el momento óptimo para el control de las malas hierbas entre BBCH 21 y BBCH 23, primeros hijos del cereal. Para obtener su máxima eficacia, **INTENSITY** debe ser aplicado cuando la mala hierba se encuentre entre 6 y 12 hojas.

PREPARACIÓN DEL CALDO

El volumen de caldo puede variar entre 200 y 400 litros/ha, asegurando mojar bien la mala hierba. Llenar a la mitad el tanque del equipo de pulverización con agua y añadir la cantidad necesaria de **INTENSITY**. Añadir el resto del agua agitando continuamente para asegurar una mezcla homogénea del producto y mantener la agitación hasta el final de la aplicación.

Utilizar siempre agua limpia. Preparar el caldo, justo antes de la aplicación.

CULTIVOS COLINDANTES

Se recomienda aplicar sólo cuando las condiciones atmosféricas sean favorables y cuando la velocidad del viento sea inferior a 18 km/h. Durante la aplicación, es importante evitar la deriva hacia zonas colindantes. En particular, se debe mantener una distancia de seguridad mínima de 5 m a los cultivos colindantes sensibles, especialmente girasol, remolacha, leguminosas, hortícolas, frutales y viña.

LIMPIEZA DEL TANQUE

Enjuagar cuidadosamente el tanque y el equipo de pulverización después de la aplicación: primero con agua limpia, luego llenar el tanque y añadir 0.5 litros de lejía por 100 litros de agua y al final enjuagar otra vez con agua limpia.

CULTIVOS POSTERIORES

La recomendación general de uso es cereal tras cereal. Cuando se aplica **INTENSITY** en cereal los residuos pueden permanecer en el suelo y la paja después de la cosecha sin que le afecte al cereal. Para facilitar la degradación del producto, incorporar la paja y el rastrojo mediante una labor profunda de volteo (ej.: vertedera), lo antes posible después de la cosecha y al menos 6 meses antes de la siembra de cultivos sensibles. En caso de fallo del cultivo, transcurrido 1 mes de la aplicación puede sembrarse trigo, cebada, maíz y praderas de gramíneas.

Siguiendo las prácticas habituales de rotación de cultivos, después de una aplicación de **INTENSITY**, se puede sembrar:

- transcurridos 4 meses: maíz, praderas de gramíneas y colza;
- transcurridos 12 meses: girasol, algodón, patata y remolacha;
- transcurridos 24 meses: leguminosas y resto de cultivos.

Antes de sembrar otros cultivos consultar con el Servicio Técnico de Dow AgroSciences Ibérica.

No se debe utilizar la paja o el estiércol obtenido del cereal tratado con **INTENSITY** para cultivos sobre pacas, mantillo, plantas ornamentales o cultivos sensibles (como solanáceas y leguminosas). La paja tratada con **INTENSITY** no debe ser usada para el cultivo de champiñón ni para hacer compost.

En el caso de fertilización orgánica en cultivos sensibles (como por ejemplo, leguminosas o solanáceas) en parcelas que hayan sido tratadas con Intensity y pastoreadas posteriormente por ganado, y/o hayan sido abonadas con estiércol proveniente de ganado estabulado o alimentado con paja tratada con Intensity, se debe esparcir e incorporar la paja, rastrojo o estiércol al suelo mediante una labor profunda de volteo (ej.: vertedera) al menos 6 meses antes de la siembra.

No utilizar el estiércol proveniente de ganado estabulado o alimentado con paja tratada con Intensity en cultivos sensibles ya implantados.

MANEJO ANTI-RESISTENCIAS

INTENSITY es una mezcla de dos materias activas con distinto modo de acción, Aminopirralid y Florasulam.

Para evitar el riesgo de aparición de resistencias aplicar **INTENSITY** sólo una vez por campaña, realizar un laboreo mecánico y, en las zonas en las que sea factible, practicar la rotación de cultivos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INTENSITY tiene demostrada eficacia en *Papaver* y sus biotipos. Se puede mezclar con todos los avenicidas, excepto tralkoxidim.

Puede aplicarse en condiciones de frío (5°C) y con una amplia ventana de aplicación.

Antes de mezclar con otros productos autorizados en trigo y cebada consultar con el Servicio Técnico de Dow AgroSciences Ibérica.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES: Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

