

Sanmite®

Tratamiento acaricida/insecticida

Envase de 1 kg y 3 kg



> **Formulación** Polvo mojable (WP). Piri-daben 20%.

> **Características** Acaricida para frutales de pepita, melocotonero, nectarina, albaricoquero, cítricos, vid y parral contra larvas, adultos de araña roja y contra mosca blanca. En hortícolas y cítricos.

> Usos autorizados

CULTIVOS	USOS AUTORIZADOS	PLAZO SEGURIDAD
Frutales de pepita, melocotonero, nectarina y albaricoquero	Araña roja	15 días
Cítricos	Araña roja / mosca blanca	15 días
Viñedo y parral de vid	Araña roja	15 días
Judías verdes, cucurbitáceas, fresa, berenjena, pimiento, tomate	Araña roja / mosca blanca	7 días

> **Dosis y modo de empleo** Frutales de pepita, melocotonero, nectarina y albaricoquero: 0,075%-0,1% (0,5 kg - 1,5 kg de producto formulado por ha).

Cítricos: 0,05% a 0,1% (de 2 kg a 4 kg de producto formulado por ha).

Cítricos contra mosca blanca: 0,025% cuando la plaga esté en los primeros estadios.

Viñedo y parral de vid: 0,05% a 0,1%.

Aplicar en pulverización normal.

Solanáceas, cucurbitáceas y judías verdes contra araña roja y mosca blanca: 0,1%.

Hortícolas contra mosca blanca: 0,1%.

> **Advertencias** No aplicar mas de una vez Sanmite® PM por ciclo de cultivo o campaña. Tampoco debe aplicarse en dicho periodo ningún otro acaricida con el mismo modo de acción (METI), tales como los formulados con fenazaquin, fenpiroximato, piridaben y tebufenpirad, ya sea solo o en mezcla.