

ALEXIN[®]

75 LS



**FUNGICIDA ANTI-MILDIU SISTÉMICO
PARA LA VID**

EL COMODÍN PARA LOS PROGRAMAS ANTIMILDIU



ALEXIN® 75 LS




ALEXIN® 75 LS, UNA SOLUCIÓN PARA CADA VIÑEDO.

FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, ASOCIACIÓN POSIBLE CON MUCHAS ESPECIALIDADES (OTRAS MATERIAS ACTIVAS).
PROTECCIÓN DE LOS ÓRGANOS EN FORMACIÓN, GRACIAS A SU POTENTE SISTEMA (ASCENDENTE Y DESCENDENTE).
SIN RESISTENCIA CONOCIDA, DEBIDO A SU MODO DE ACCIÓN MULTIPUNTO, CONTRA TODAS LAS CEPAS DE MILDIU.

MECANISMO DE ACCIÓN DE **ALEXIN® 75 LS**

1 ESTIMULA LAS DEFENSAS NATURALES DE LA PLANTA

- Efecto potenciador de los fungicidas.
- En lucha preventiva evita la contaminación de la viña y la mantiene protegida más de 10-12 días.
- Especialidad sin riesgo de aparición de cepas resistentes.



Cuando el hongo parásito penetra en los tejidos de una planta tratada con **ALEXIN® 75 LS**, las células de los tejidos invadidos segregan fitoalexinas, que **inhiben rápidamente el desarrollo del hongo parásito**.

2 ACCIÓN DIRECTA

- Aparte del efecto estimulador de defensas, posee una acción directa sobre la multiplicación del hongo perturbando la germinación de las esporas.
- **ALEXIN® 75 LS** presenta una acción fungistática que inhibe el crecimiento del hongo.

FUNGICIDA ANTIMILDIU DE LA VID

IMPORTANCIA DE LA DOBLE SISTEMIA DE **ALEXIN® 75 LS**

- Sistemía ascendente y descendente a la vez.
- Los brotes formados después del tratamiento de la viña están también protegidos.
- Acción rápida y eficacia de gran regularidad.
- Larga persistencia que puede llegar a los 14 días. El intervalo entre tratamientos depende del producto de mezcla y del riesgo de mildiu (10-14 días). En mezcla con cobres será de 10 días. **ALEXIN® 75 LS** debe utilizarse siempre con otro producto en mezcla.
- Muchas COMBINACIONES POSIBLES, para poder adecuarse a cada situación.

SELECTIVIDAD PARA EL CULTIVO

La calidad de la formulación y el equilibrio entre las sales de fosfonatos hacen que **ALEXIN® 75 LS** sea selectivo en todas las variedades de vid.

CALIDAD DEL MOSTO Y VINO

ALEXIN® 75 LS no presenta ninguna incidencia sobre la fermentación del mosto ni sobre la calidad organoléptica de los vinos.

PARA EXPORTACIÓN: EU, CODEX, USA, SUIZA, CANADA, RUSIA, JAPÓN, ARGENTINA, BRASIL, ISRAEL, TURQUIA, SUDÁFRICA, INDIA, COREA DEL SUR, TAIWAN, etc. (100 ppm. Import Tolerance) para uva de mesa y vino.



Mildiu en hoja de vid (Plasmopara viticola)



Mildiu en racimo de viña antes de la floración



Mildiu en racimo de vid (Plasmopara viticola)

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN DE **ALEXIN® 75 LS**

La protección recomendada de la vid consiste en ajustar una estrategia a los riesgos de contaminación, con una alternancia de materias activas que tengan en cuenta los fenómenos de resistencia, utilizando fungicidas con diferentes modos de acción y que además pertenezcan a diferentes familias químicas.

ALEXIN® 75 LS puede asociarse a un gran número de productos, eligiendo en cada caso el más adecuado en cada situación:

MEZCLA CON PRODUCTOS DE CONTACTO CON UNA SOLA MATERIA ACTIVA

ALEXIN® 75 LS a 2 l/ha + **FOLPERAN 80 WG** 1 - 2 kg/ha

ALEXIN® 75 LS a 2 l/ha + **MACUPRAX 80** a 2 kg/ha

MEZCLA CON PRODUCTOS PENETRANTES CON DOS MATERIAS ACTIVAS

ALEXIN® 75 LS a 2 l/ha + **ALIADO CM WG** 1 - 2 kg/ha

MEZCLA CON PRODUCTOS SISTÉMICOS CON DOS MATERIAS ACTIVAS

ALEXIN® 75 LS a 1,5 l/ha + **SPONSOR® COMBI** 1 - 2 kg/ha

ALEXIN® 75 LS a 1,5 l/ha + **SPONSOR® MZ** 1,5 - 2 kg/ha

ALEXIN® 75 LS a 1,5 l/ha + **VINCARE®** 1,5 - 2 kg/ha

MEZCLA CON PRODUCTOS CON COBRE (NO USAR DE FLORACIÓN A CUAJADO)

ALEXIN® 75 LS a 2 l/ha + **COBRE NORDOX® WG** 0,5 - 1 kg/ha

NO MEZCLAR CON FORMULADOS A BASE DE OXICLORURO DE COBRE

ALEXIN® 75 LS



UTILIZAR **ALEXIN® 75 LS** SIEMPRE EN MEZCLA CON OTRO FUNGICIDA.

LOS INTERVALOS DE TRATAMIENTO SERÁN DE 10 A 14 DÍAS, DEPENDIENDO DEL RIESGO DE MILDUI Y DEL PRODUCTO ACOMPAÑANTE.

EN LAS MEZCLA CON COBRE NO SOBREPASAR LOS 10 DÍAS SI HAY RIESGO DE INFESTACIÓN.

PARA TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CON UNA PULVERIZACIÓN DE CALIDAD (SIEMPRE POR AMBAS CARAS).

LAS DOSIS MÁXIMAS O MÍNIMAS DEPENDEN DEL VOLUMEN DE VEGETACIÓN Y DEL RIESGO DE MILDUI DE CADA MOMENTO.

NO ASOCIAR NUNCA CON ABONOS FOLIARES QUE CONTENGAN NITRÓGENO O DERIVADOS.

RESUMEN DE PROPIEDADES DE **ALEXIN® 75 LS**

- SISTEMIA ASCENDENTE Y DESCENDENTE.
- PROTECCIÓN DE ÓRGANOS EN FORMACIÓN Y GRAN PROTECCIÓN DE LOS RACIMOS.
- FAVORECE LAS DEFENSAS NATURALES DE LA PLANTA.
- SELECTIVO EN TODAS LAS VARIEDADES.
- EFICAZ CONTRA TODAS LAS CEPAS DE MILDUI.
- SIN RIESGO DE RESISTENCIAS.
- ACEPTADO EN PRODUCCIÓN INTEGRADA.
- SIN PROBLEMAS DE RESIDUOS PARA LA EXPORTACIÓN.
- TIENE LA POSIBILIDAD DE ASOCIACIÓN CON MUCHOS PRODUCTOS ADAPTÁNDOSE A CADA SITUACIÓN.
- NO INCIDE EN LA FERMENTACIÓN DEL MOSTO NI EN LA CALIDAD DEL VINO.



ALEXIN[®] 75 LS



FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Fosfonato de Potasio 75,5% p/v (755 g/l)

FORMULACIÓN:

Líquido soluble LS

REGISTRO Nº:

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 25.498

CULTIVOS:

Vid para vino y uva de mesa

PLAZO DE SEGURIDAD:

14 días en ambos cultivos

ENFERMEDAD:

Mildiu (*Plasmopara vitícola*)



Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información facilitada en este folleto sobre el producto se basa en el conocimiento que COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., dispone en la fecha de su publicación, pero no garantiza que sea precisa o completa y en ningún caso COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. tiene la obligación de actualizarla.



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com