Siempre eficaz contra oídio y moteado

Rapidez de penetración y gran acción sistémica:	Total selectividad:
Penetra rápidamente en el interior de la planta (en 1h) y se transloca a todas las partes verdes de la misma, quedando protegido del lavado por las lluvias posteriores a la aplicación.	**Systhane Forte** es totalmente selectivo para el cultivo a cualquier temperatura ambiental, a las dosis recomendadas.

Gran eficacia y persistencia:	Respetuoso con la fauna útil y el medio ambiente
Systhane Forte es siempre eficaz contra todas las especies de oídio y con una gran persistencia de acción que protege los brotes de nuevo desarrollo	No presenta efectos adversos sobre la fauna útil. Está recomendado en los programas de lucha integrada.

Dow AgroSciences

Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Composición:
Miclobutanil 24% p/v.

Formulación:
Concentrado emulsionable (EC).

Clasificación toxicológica:
Nocivo (Xn).

Clasificación para fauna:
Mamíferos, aves y peces: Baja Toxicidad "A".
Abejas: Compatible.
No contaminar el agua con el producto ni con su envase.
Entregarlo enjuagado y vacío al sistema integrado de gestión SIGFITO.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, con el nº 22.563.

Dow AgroSciences Ibérica, S.A.
Ribera del Loira, 4-6, 4ª • 28042 Madrid
Tel.: 91 740 77 00 • Fax: 91 740 78 01
www.dowagrosciences.es

® Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía filial de Dow

Antioídio con acción preventiva y curativa

Systhane® Forte
FUNGICIDA

Dow AgroSciences

Soluciones para un Mundo en Crecimiento

Systhane® Forte
FUNGICIDA

Actúa de dos modos

Preventivo:	Curativo:
Systhane Forte impide la germinación de las esporas y por tanto, la infección del hongo en la planta.	Cuando el hongo ya está establecido en la planta y en período de incubación, **Systhane Forte** detiene el desarrollo del micelio, impidiendo nuevas reinfecciones.



Frutales de hueso y pepita

Systhane Forte ejerce una acción superior a la de otros fungicidas contra las contaminaciones primarias, reduciendo el número de esporas y las nuevas reinfecciones.

OÍDIO En manzano, comenzar los tratamientos en estado C3. En melocotón, nectarino, ciruelo y albaricoquero desde la caída de pétalos, repitiendo cada 12-14 días en la época de máxima sensibilidad.

MOTEADOS En frutales de pepita, comenzar los tratamientos en estado C-D, repitiendo cada 10 días durante la época de mayor riesgo de infección. **Systhane Forte** es eficaz tanto en forma preventiva como curativa (hasta 96 horas después de la infección), pero en la práctica, no son aconsejables los tratamientos curativos, por la dificultad de concretar el momento de aplicación.
En variedades muy sensibles al moteado y periodos de alto riesgo (lluvias, nieblas, etc), puede ser aconsejable la combinación con Dithane® DG NeoTec (sólo en manzano) o Captan.

OÍDIO	DOSIS	INTERVALO	PLAZO SEGURIDAD
FRUTALES DE HUESO	20-30 cc/hl	7-14 días	7 días
FRUTALES DE PEPITA	20-25 cc/hl	7-14 días	28 días
MOTEADO	**DOSIS**	**INTERVALO**	**PLAZO SEGURIDAD**
FRUTALES DE PEPITA	20-25 cc/hl	6-10 días	28 días

Nota: Usar las dosis más altas e intervalos más cortos en tratamientos curativos.

Viña y parral

Systhane Forte se utiliza en cualquier momento vegetativo de la viña, y gracias a su excelente sistemia ofrece una gran protección del viñedo, especialmente en las épocas de mayor crecimiento del cultivo.

CONTRA OÍDIO Y BLACK ROT El número de tratamientos dependerá de la sensibilidad varietal, condiciones climáticas, infección del año anterior y de la situación de la parcela.

Son aconsejables los tratamientos en los siguientes estados fenológicos: Brotes 20 cm, floración, granos tamaño guisante y granos tamaño garbanzo.

DOSIS	20-40 cc/hl. Usar las dosis bajas en tratamientos preventivos.
PLAZO DE SEGURIDAD	15 días

PROGRAMA DE TRATAMIENTOS PARA VIÑA Y PARRAL

	DOSIS cc/ha	DOSIS cc/ha, en función del gasto de caldo por ha		
		250 lts	500 lts	800-1000 lts
Antes de la floración	100	40	20	---
Después de la floración	125-200	50-80	25-40	15-20

Hortícolas y ornamentales

Systhane Forte ejerce un gran control contra el oídio y la oidiopsis de los cultivos hortícolas y plantas ornamentales, cultivados tanto al aire libre como en invernadero.

OÍDIO Y ROYA El número de tratamientos dependerá de la sensibilidad varietal, condiciones climáticas, infección del año anterior y de la situación de la parcela.

CULTIVOS AUTORIZADOS Alcachofa, borraja, lúpulo, cucurbitáceas, pimiento, tomate, espárrago, fresales, remolacha azucarera, rosal, arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas.

PIMIENTO , TOMATE Y ALCACHOFA	OIDIOPSIS	INTERVALO	PLAZO SEGURIDAD
Preventivo	20-30 cc/hl	14 días	3 días
Curativo	40 cc/hl	7-10 días	
FRESÓN	**OIDIOPSIS**	**INTERVALO**	**PLAZO SEGURIDAD**
Preventivo	20 cc/hl	14 días	3 días
Curativo	30 cc/hl	7-10 días	
PEPINO Y CALABACÍN	**OIDIOPSIS**	**INTERVALO**	**PLAZO SEGURIDAD**
Preventivo	20-30 cc/hl	14 días	1 día
Curativo	40 cc/hl	7 días	
MELÓN Y SANDÍA	**OIDIOPSIS**	**INTERVALO**	**PLAZO SEGURIDAD**
Preventivo	20-30 cc/hl	14 días	7 días
Curativo	40 cc/hl	7 días	

OTROS CULTIVOS	DOSIS	PLAZO SEGURIDAD
ESPÁRRAGO, BORRAJA, ROSAL, ORNAMENTALES Y LÚPULO	20-40 cc/hl	15 días
REMOLACHA	250 cc/hl	28 días

Producción integrada

Systhane Forte es un fungicida incluido en programas de Producción Integrada.

- Favorable perfil ecotoxicológico
- Respeto por la fauna auxiliar.
- Baja dosis de aplicación.
- Rápida degradación en el medio ambiente.

En tratamientos curativos o cuando la presión de infección es muy elevada, se aconseja emplear las dosis más altas y repetir los tratamientos a los 7 días.

Como recomendación de uso general, para evitar la aparición de resistencias, se aconseja alternar o combinar con fungicidas de distinto modo de acción.