



Citrol-ina®



Insecticida de contacto

El aceite más seguro y eficaz

Capacidad 1 l 5 l 20 l 1000 l

Composición	Aceite de Parafina 79% p/v (790 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	15173

CARACTERÍSTICAS

CITROL-INA® es un formulado con alto contenido en complejos parafínicos, lo que le dota de un elevado residuo insulfonable (alrededor del 99%), pudiéndose aplicar sucesivas veces sin problemas de acumulación ni riesgos de fitotoxicidad.

Por sus características biodegradables, CITROL-INA® es el aceite ideal para su uso conjunto (como surfactante) con todos los productos aconsejados para el control del “minador de los brotes de los cítricos” (*Phyllocnistis citrella* Stainton), que requiere varios tratamientos con intervalos relativamente cortos.

PRECAUCIONES

CITROL-INA® es incompatible y por tanto no se puede mezclar con: azufre, captan, algunos acaricidas, antióidio, urea, correctores carenciales y dosis fuertes de determinados polvos mojables.

Realizar los tratamientos antes del cambio de color de los frutos y nunca antes de 40 días de haber aplicado un tratamiento con azufre.

No debe tratarse durante la floración.

No debe aplicarse fuera del intervalo 5-35°C.

No aplicar CITROL-INA® cuando se prevean heladas o días calurosos y secos.

En condiciones de deficiencia hídrica regar antes del tratamiento.

Deberán observarse precauciones por la fitotoxicidad del producto para frutales, especialmente los de hueso.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede establecer establecer ningún plazo de seguridad.

Cultivo	Plaga	Dosis	Volumen caldo (L/ha)	Momento aplicación	Nº Aplicaciones (intervalo)
Cítricos	Cochinillas	1-2 L/hl (a) (10-40 L/ha)	1000-2000 (a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1 - 4 (15 días)
		1-1,5 L/hl (b) (10-22,5 L/ha)	1000-1500 (b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	
	Ácaros Pulgones	1 L/hl (a) (10-20 L/ha)	1000-2000 (a)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	
Frutales de hueso Frutales de pepita	Ácaros	1 L/hl (a) (10-20 L/ha)	1000-2000 (a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1 - 4 (15 días)
Almendro*, Anacardos*, Avellano*, Castaño*, Cocos*, Macadamias*, Nogal*, Pacanas*, Pino piñonero*, Pistacho*	Ácaros Cochinillas Pulgones	1 L/hl (a) 10-20 L/ha	1000-2000 (a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1 - 4 (15 días)
Aguacate*	Cochinillas	1 L/hl (a) 10-20 L/ha	1000-2000 (a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1 - 4 (15 días)
		1-1,5 L/hl (b) (10-22,5 L/ha)	1000-1500 (b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	
	Ácaros Pulgones	1-1,5 L/hl (b) (10-22,5 L/ha)	1000-1500 (b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	

Mango*	Cochinillas	1 L/hl (a)(b) (10-20 L/ha)	1000-2000(a)(b)	Desde BBCH 69 (a) hasta BBCH 85 Desde BBCH 00 (b) hasta BBCH 69	1 - 4 (15 días)
	Ácaros Pulgones	1 L/hl (b) (10-20 L/ha)	1000-2000(b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	

*Usos menores: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51 Reglamento (CE) 1107/2009). La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.

- ✓ (a) Aplicación en verano
- ✓ (b) Aplicación en invierno.
- ✓ BBCH 00: reposo: yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de escamas.
- ✓ BBCH 69: fin de la floración: han caído todos los pétalos.
- ✓ BBCH 85: maduración avanzada.