


TaloSint® Hortiplus



Solución de abono
a base de COBRE

Composición

Cobre (Cu) soluble en agua: 5.6 %

pH = 7,2

Líquido Soluble (SL)

PRESENTACIÓN

Botella de 250 mL (Caja de 40x250 mL)

Botella 1 L (Caja de 12x1 L)

Garrafa 5 L (Caja de 4x5 L)

Garrafa 20 L

COMPATIBILIDADES

TaloSint® Hortiplus es compatible con la mayoría de los productos habitualmente empleados en los tratamientos agrícolas. No mezclar con productos hormonales, aceites, polisulfuros y fungicidas.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Nocivo.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con ojos, piel y vestido, utilizando la indumentaria adecuada y observando las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. Almacenar los envases cerrados herméticamente en lugar fresco y seco.

CLASIFICACIÓN ADR

UN 3082 MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, n.e.p. (Cobre), 9, M6, III, ADR

LEGISLACIÓN APLICABLE

Fertilizante.

Abono CE.

ADVERTENCIA

Las características técnicas presentadas en este informe tienen carácter informativo y pueden ser susceptibles de variación sin previo aviso.

Características/Propiedades

TaloSint® Hortiplus es un abono líquido a base de cobre.

Su aplicación está dirigida a la corrección y prevención de la carencia de Cobre en distintos cultivos.

TaloSint® Hortiplus penetra en la planta de forma rápida, consiguiéndose una eficaz asimilación del Cobre.

Dosis y modo de empleo

- HORTÍCOLAS:

- FERTIRRIGACIÓN: 15-20 L/Ha. Suprimir el abonado nitrogenado al suelo al menos durante 10 días. Aplicar cuando se haya hecho entre el 30% y el 70% del riego. Se puede repetir el tratamiento 3-4 veces.

- APLICACIÓN AL CUELLO: pulverizar con mochila sin difusor a la dosis de 2-5 mL por litro de agua, mojando bien la zona del cuello de la planta y el suelo inmediatamente debajo. Procurar no manchar las hojas con este caldo.

- CULTIVO HIDROPÓNICO: 2-5 L/Ha.

- VIÑA: En vegetación, antes de la floración, pulverizar al 0.2-0.5% (200-500 mL por cada 100 litros de agua), repitiendo si fuera necesario. Después de la recolección al 1%.

- OLIVO: Pulverizar el Olivo con un caldo al 0.2-0.4% (200-400 mL por cada 100 litros de agua). Debe procurarse mojar bien todo el follaje y ramas del arbolado. Tratar al inicio de la Primavera y al inicio del Otoño.

- PERA CONFERENCIA: Pulverizar a 0,25% (250 mL por cada 100 litros de agua) desde el momento del cuaje y repetir de 3 a 5 tratamientos.

- FRUTALES DE PEPITA: Pulverizar al inicio de la brotación al 0.3% (salvo en Blanquilla de Aranjuez).

- FRUTALES DE HUESO: Pulverizar a la caída de hoja al 0.5-1% y en botón rosa al 0.5%.

- NOGAL: Tratar a 0,35% (350 mL por cada 100 litros de agua). Repetir 2-3 tratamientos.

- AVELLANO: Pulverizar a la caída de hoja al 0.5% y en vegetación al 0.3%.

- NÍSPERO: Tratar de 0.3-0.5% por pulverización foliar.

- NARANJO: Tratar al 0.3% por pulverización foliar, antes de la floración. En la variedad Fortuna, repetir 2-3 veces.