

Cabor

FUNGICIDA

Características: Es un fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva, recomendado en el control de oomicosis (mildius), repilo y otras enfermedades causadas por hongos endoparásitos y bacterias.

Composición: Sulfato Cuprocálcico 20% (200 gr/kg)

Formulación: Polvo mojable.

Nº de Registro: 21716

Uso y dosis autorizados

Cultivo Enfermedad	Condiciones de uso
Alcachofa (aire libre) <i>Mildiu, Alternaria, Tizón, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera está desplegada hasta que el tallo principal empieza a salir de la cabeza (BBCH 15-51). Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha
Almendro <i>Abolladura, Monilia, Cribado, Bacteriosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas hasta apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro visibles (BBCH 95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Abolladura: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha Monilia, Cribado, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-833 l/ha
Avellano, Nogal <i>Monilia, Bacteriosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas hasta apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro visibles (BBCH 95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-833 l/ha
Berenjena (aire libre e invernadero) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-683 l/ha Invernadero (mochila): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-716 l/ha
Brécol, Coliflor (aire libre) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera está desplegada hasta primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía (BBCH 14-59). Mildiu, Alternaria: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha



BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

Guisantes verdes, judías verdes (aire libre) <i>Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja está desplegada o el 4º zarcillo desarrollado (en variedades sin hojas) hasta la madurez completa (BBCH 14-89). Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha
Lechuga y similares (aire libre e invernadero) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que se alcanza el tamaño, forma y firmeza de la cabeza típicos. (BBCH 12-49). Aire libre: Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-683 l/ha Invernadero (mochila): Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-716 l/ha
Olivo <i>Repilo, Tuberculosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85), recomendándose 1-3 aplicaciones en primavera y/o 1-3 aplicaciones en otoño. Repilo: Dosis por aplicación: 0,38-0,83% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 600-1000 l/ha Tuberculosis: Dosis por aplicación: 0,6-0,83% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 600-833 l/ha
Ornamentales leñosas (aire libre e invernadero) <i>Septoria, Roya</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar en cualquier fase de desarrollo de la planta. Aire libre: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-683 l/ha Invernadero (mochila): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-716 l/ha
Patata <i>Mildiu, Alternaria</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta bayas <u>de la fructificación</u> de 1er grado, de color ocre o amarillentadas (BBCH 14-85). Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria: Dosis por aplicación: 0,6-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha
Pimiento excepto "tipo guindilla" (aire libre e invernadero) <i>Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-683 l/ha Invernadero (mochila): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-716 l/ha
Pistacho <i>Alternaria, Bacteriosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas hasta apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro visibles (BBCH 95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-833 l/ha
Puerro (aire libre) <i>Mildiu, Alternaria, Tizón, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera está desplegada hasta que el tallo principal empieza a salir de la cabeza (BBCH 15-51). Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-4 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha

Cebolla, Ajo, Chalote (aire libre) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 4ª hoja está claramente visible hasta la inclinación de follaje: en 10% de las plantas, hojas inclinadas (BBCH14-47). Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha
Cítricos <i>Aguado, Bacteriosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que se hacen visibles varias hojas, pero sin alcanzar su tamaño final hasta que el fruto está maduro y apto para el consumo (BBCH 15-89). Dosis por aplicación: 0,2-0,5% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 1000-2000 l/ha
Pepino, Pepinillo y Calabacín (aire libre e Invernadero) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89). Aire libre: Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1,25% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1,25% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 400-683 l/ha Invernadero (mochila): Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1,25% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1,25% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 400-716 l/ha
Melón, Sandía y Calabaza (aire libre e Invernadero) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados (BBCH 10) hasta la madurez completa (BBCH 89). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-683 l/ha Invernadero (mochila): Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-716 l/ha
Fresal (aire libre e Invernadero) <i>Antracnosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta que los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico (BBCH 13-85). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,5-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Dosis por aplicación: 0,5-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-820 l/ha Invernadero (mochila): Dosis por aplicación: 0,5-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-860 l/ha
Frutales de hueso <i>Abolladura, Monilia, Cribado, Bacteriosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que el 50% de las hojas están descoloreadas o caídas hasta apertura de yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles (BBCH 95-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Abolladura: Dosis por aplicación: 0,38-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Monilia, Cribado, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1,25% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha
Frutales de pepita <i>Moteado, Monilia, Chancro, Bacteriosis</i>	1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que los brotes han completado su desarrollo hasta apertura de yema: las puntas verdes de las hojas, que aún encierran las flores, visibles (BBCH 91-53), recomendándose 1-2 aplicaciones a la caída de hojas (50-100%) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Moteado: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-1000 l/ha Monilia, Chancro, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 500-833 l/ha

Distribuido por:

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

Cabor

FUNGUICIDA

Tomate (aire libre e invernadero) <i>Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis</i>	1-5 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 7 días. Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 15-89). Aire libre: Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-5 kg/ha); Vol. de caldo: 400-833 l/ha Invernadero (lanza o pistola): Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,1 kg/ha); Vol. de caldo: 410-683 l/ha Invernadero (mochila): Mildiu: Dosis por aplicación: 0,38-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-1000 l/ha Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis: Dosis por aplicación: 0,6-1% (3,75-4,3 kg/ha); Vol. de caldo: 430-716 l/ha
---	---

Para todos los usos autorizados:

- no superar la dosis máxima de 20 kg producto/ha y año.
- no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.

PLAZO DE SEGURIDAD ENTRE EL ÚLTIMO TRATAMIENTO Y LA RECOLECCIÓN

Berenjena y Tomate: 10 días (aire libre) y 3 días (invernadero)

Cítricos, Brécol, Coliflor, Olivo, Patata y Pimiento: 14 días

Ajo, Cebolla y Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes y Judías verdes: 3 días

Alcachofa, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal, Puerro, Lechuga y similares: 7 días

Frutales de hueso, Frutales de pepita, Almendro, Avellano, Nogal, Pistacho y Ornamentales leñosas: No procede

MODO DE EMPLEO

En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización foliar normal con tractor o en pulverización manual con lanza/pistola o con mochila. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con lanza/pistola o con mochila.

Aplicar el producto preventivamente adaptándolo a la evolución de la enfermedad y las condiciones climáticas, siguiendo las recomendaciones de los boletines regionales de sanidad vegetal.

Aplicar un volumen de pulverización suficiente para cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen necesario dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del

Clasificación Toxicológica



ATENCIÓN

BRANDT®

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40