



Insecticida de origen vegetal.

Capacidad

Composición	Piretrinas 4% p/v (40 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	ES-00243

CARACTERÍSTICAS

Insecticida de origen vegetal a base de extracto de flores de crisantemo, no sistémico que actúa por contacto y ofrece rápida penetración. Su sitio de acción son los canales de sodio del sistema nervioso de los insectos, donde penetran rápidamente a través de la cutícula, provocando la parálisis muscular y finalmente la muerte del insecto. Cuenta con un efecto de choque y tiene una persistencia muy baja, lo cual permite efectuar intervenciones muy concretas sin consecuencias prolongadas

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar mediante pulverización foliar y mediante pulverizadores motorizados y manuales.

ÉPOCA DE EMPLEO

Aplicar al principio del ataque, cuando los primeros síntomas son visibles, antes de la suelta de artrópodos no Diana.

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	Nº Aplicaciones (intervalo)	Volumen caldo (L/ha)	Plazo de seguridad (días)
Berenjena (Invernadero)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> y <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	2 (7 días)	833 - 1000	1
Cucurbitáceas de piel comestible (incluye pepino y calabacín) (Invernadero)					
Cucurbitáceas de piel no comestible (incluye melón, calabaza y sandía) (Invernadero)					
Pimiento (Invernadero)					
Tomate (Invernadero)	Pulgones (<i>Myzus persicae</i>)	0,6		666 - 800	3
Frutales de hueso (incluye melocotón y variedades, albaricoque y ciruela)					
Lechuga y similares (Aire libre e Invernadero)	Pulgones (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> y <i>Aphis fabae</i>)	0,6		666 - 800	2
Espinacas y similares (Aire libre e Invernadero)					

Nº de aplicaciones: 2 (7 días)

Volumen de caldo: 833-1000 para todos los cultivos excepto para lechugas y similares: 666-880.

- Berenjena: invernadero.
- Cucurbitáceas de piel comestible: invernadero e incluye pepino y calabacín.
- Cucurbitáceas de piel no comestible: invernadero e incluye melón, calabaza y sandía.
- Pimiento: invernadero.
- Tomate: invernadero.
- Frutales de hueso incluye melocotón y variedades, albaricoque y ciruela. Para estos dos últimos, aplicar en prefloración.
- Lechugas y similares: aire libre e invernadero. incluye también espinacas y similares.