

## **CIPRODINIL 30% [EC]**

Altera el desarrollo del hongo al interferir en la síntesis de aminoácidos. Inhibe la germinación de las esporas y el desarrollo del tubo germinativo, impidiendo la penetración en el cultivo y el crecimiento interno del micelio

## QUALY

- FUNGICIDA SISTÉMICO CON ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA
- PRODUCTO IDEAL PARA
  ALTERNAR CON FUNGICIDAS
  CON DIFERENTE MODO
  DE ACCIÓN Y PREVENIR LA
  APARICIÓN DE RESISTENCIAS
  (Código D1 según FRAC)
- LAS BAJAS TEMPERATURAS NO ALTERAN SU EFICACIA
- BAJO RIESGO TOXICOLÓGICO
   PARA ABEJAS Y ARTRÓPODOS
   BENEFICIOSOS

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS (L/ha) P.S.\*

Vid<sub>(1)</sub> Botritis 1,25 21 días

(1) Uva de mesa y de vinificación. Un máximo de 2 aplicaciones /campaña, separadas por un intervalo de 10-20 días. Volumen de caldo 600-1000 L/ha.

\* Plazo de Seguridad



Nufarm España, S.A.

® marca registrada

Balmes, 200 1° 4° - 08006 - Barcelona - España Tel.: + 34 93 238 98 90 - Fax: +34 93 415 17 89 e.mail: nufarm@nufarm.com