



Fungicida antimildiu

Capacidad 5 kg

Composición	Cimoxanilo (330 g/kg) p/p. Zoxamida (330 g/kg) p/p
Formulación	(WG) Microgranulado Soluble
Nº Registro	ES-00004

CARACTERÍSTICAS

Fungicida que contiene dos sustancias activas complementarias con múltiples mecanismos de acción para el control de mildius en diversos cultivos. Resulta particularmente interesante para la protección de los frutos posteriores a la infección.

Zoxamida, de acción preventiva, destruye las esporas antes de que se produzca la infección, mientras que Cimoxanilo, además, es capaz de parar el crecimiento miceliar durante los 2 - 3 días siguientes a la misma.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar en pulverización normal sólo al aire libre con pulverizador hidráulico con tractor o manual. Patata: Se aconseja tratar de modo preventivo con un volumen de caldo de 200-1.000 l/ha, en función del desarrollo vegetativo y de las condiciones favorables al ataque de la enfermedad. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días. Tomate y berenjena: Se aconseja tratar de modo preventivo con un volumen de caldo de 500-800 l/ha. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 -10 días.

Vid: Aplicar en pulverización normal desde el estadio 3 hojas desplegadas (BBCH 14), con un volumen de caldo de 200-1000 l/ha. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días.

Aplicaciones autorizadas	Plazos de seguridad (días)	Enfermedades	Dosis
Berenjena	3	Mildiu	400-450 g/ha
Patata	7		450 g/ha
Tomate	3		400-450 g/ha
Vid	28		400 g/ha