



Fungicida antimildiu para patata, tomate, berenjena, lechuga y vid

Capacidad 1 l

Composición	Amisulbrom 20% p/v (200 g/l)
Formulación	(SC) - Suspensión concentrada
Nº Registro	25.362

CARACTERÍSTICAS

Producto a base de Amisulbrom, sustancia de acción antimildiu de fijación a la cutícula. Presenta acción preventiva y una alta actividad antiesporulante, siendo resistente al lavado por lluvia.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar en pulverización normal en cultivos al aire libre. Realizar un máximo de 3 tratamientos con un intervalo de 7-10 días entre los mismos mediante tractor (en vid el intervalo será de 10 días).

ÉPOCA DE EMPLEO

- **Berenjena:** desde BBCH 63 (3ª inflorescencia: 1ª flor abierta) hasta BBCH 88 (el 80% de los frutos muestra el color típico de la madurez). Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
- **Lechuga:** desde BBCH 21 (9 o más hojas verdaderas desplegadas). Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
- **Patata:** desde BBCH 21 (primer brote basal lateral, visible (>5 cm)). Volumen de caldo: 200-1000 l/ha.
- **Tomate:** desde BBCH 63 (3ª inflorescencia: 1ª flor abierta) hasta BBCH 88 (el 80% de los frutos muestra el color típico de la madurez). Volumen de caldo: 100-1000 l/ha.
- **Vid:** desde BBCH 12 (9 o más hojas desplegadas) hasta BBCH 83 (las bayas brillantes). Volumen de caldo: 100-1000 l/ha

Aplicaciones autorizadas	Plazos de seguridad (días)	Enfermedades	Dosis
Berenjena	3	Mildiu	0,4-0,6 l/ha
Lechuga			0,4-0,5 l/ha
Patata	7		0,4-0,6 l/ha
Tomate	3		0,375 l/ha
Vid	28		