

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

SITOFEX®

NÚMERO DE REGISTRO

23.278

COMPOSICIÓN

Forclorfenurón 1 % p/v. Contiene etanol (CAS 64-17-5).

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable (EC).

DESCRIPCIÓN

SITOFEX® es un regulador de crecimiento muy activo que aumenta el tamaño de los frutos de kiwi (variedad Hayward) y vid. El ingrediente activo Forclorfenurón (CPPU) actúa a través del incremento del tamaño y el número de las células mostrando una directa influencia en el fruto y no se trasloca en los tejidos de las plantas, es suficiente aplicar directamente sobre los frutos.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



H302 Nocivo en caso de ingestión.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

P261 Evitar respirar la niebla de pulverización.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P280 Llevar guantes, mascarilla y prendas de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón abundantes.



P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.



PELIGRO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Envase 250 ml

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Usar concentraciones de SITOFEX® de 50 a 100 cc de producto por 100 litros de agua, lo que corresponde a una concentración de 5-10 ppm de ingrediente activo.

| Cultivo | Efecto | Dosis | Volumen de caldo | Forma y época de aplicación | P.S (días) |
|---------|---------------------------|--------------|--|---|------------|
| Kiwi | Aumentar tamaño de fruto. | 50-100 cc/hl | 1.000-1.500 l/ha | Tratar a las 3-4 semanas de la plena floración, sin superar 1 Kg/Ha. de producto. | 60 |
| Vid | | | 1.000 l/ha en pulverización foliar. 500 l/ha en aplicación dirigida al fruto. | Tratar en pulverización foliar, con un volumen de caldo de hasta 1.000 l/Ha. (5-10 g.s.a/Ha.) o en aplicación dirigida al fruto, con un volumen de caldo de 500 l/Ha. (2,5-5 g.s.a/Ha.) | NP |

Aplicar como una fina nube para mojar bien todos los frutos, evitando la formación de goteo. Aplicar preferiblemente por la mañana o al final de la tarde evitando siempre las horas del mediodía. Evitar aplicar si hay riesgo de lluvia. No mezclar SITOFEX® con otros productos. Como la eficacia del producto depende de muchas variables como vigor de los árboles, régimen de abonado, cantidad de producción y condiciones meteorológicas, recomendamos realizar pruebas previas antes de aplicar el producto en tratamientos masivos. Después de la aplicación de SITOFEX® se necesita ajustar los medios de producción ya que las necesidades de la planta aumentan. Por esta razón, es importante ajustar las aplicaciones de abono y balance de riegos de acuerdo con las necesidades del cultivo. SITOFEX® puede alterar levemente la forma de los frutos. Aplicar únicamente en plantaciones con frutos bien polinizados.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.