

**GUÍA**


# *Tratamientos en Cereales*







**SIPCAM**  
IBERIA



## HERBICIDAS

|                               | ARBITER | BALKAR | BOUDHA | CERCO | CORCEL<br>WG | MILANO<br>LQM | MOST<br>MICRO HL | VERTIGO | VOLCAN |
|-------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------------|---------------|------------------|---------|--------|
| <i>Alopecurus myosuroides</i> | -       | -      | -      | -     | -            | -             | B                | -       | -      |
| <i>Avena sp.</i>              | -       | -      | -      | -     | -            | -             | -                | -       | R      |
| <i>Calendula arvensis</i>     | -       | -      | -      | -     | -            | B             | -                | -       | -      |
| <i>Chrysanthemum segetum</i>  | N       | B      | E      | B     | B            | E             | R                | S       | -      |
| <i>Centaurea cyanus</i>       | -       | B      | B      | B     | -            | S             | B                | R       | R      |
| <i>Cirsium arvense</i>        | N       | E      | R      | B     | R            | E             | N                | N       | R      |
| <i>Diplotaxis eurocoides</i>  | N       | E      | R      | B     | R            | B             | N                | E       | -      |
| <i>Fumaria officinalis</i>    | R       | B      | R      | B     | R            | R             | B                | R       | -      |
| <i>Galium aparine</i>         | E       | E      | R      | R     | R            | E             | R                | S       | S      |
| <i>Lamium amplexicaule</i>    | -       | -      | -      | -     | -            | B             | -                | E       | E      |
| <i>Lolium sp.</i>             | -       | -      | -      | -     | -            | -             | R                | -       | -      |
| <i>Matricharia chamomila</i>  | R       | E      | E      | -     | S            | E             | B                | R       | B      |
| <i>Papaver roheas</i>         | N       | E      | E      | -     | E            | E             | E                | B       | B      |
| <i>Polygonum aviculare</i>    | B       | B      | -      | -     | B            | E             | R                | E       | E      |
| <i>Phalaris paradoxa</i>      | -       | -      | -      | -     | -            | -             | E                | -       | -      |
| <i>Salsola kali</i>           | -       | -      | -      | E     | -            | -             | -                | E       | -      |
| <i>Senecio vulgaris</i>       | -       | -      | -      | B     | -            | -             | -                | S       | -      |
| <i>Sinapis arvensis</i>       | S       | E      | E      | B     | E            | B             | B                | B       | E      |
| <i>Scandix pecten</i>         | N       | E      | E      | -     | E            | S             | N                | N       | -      |
| <i>Stellaria media</i>        | -       | E      | -      | -     | -            | E             | -                | E       | -      |
| <i>Veronica hederifolia</i>   | N       | S      | R      | -     | R            | N             | E                | B       | B      |
| <i>Viola arvensis</i>         | -       | E      | -      | -     | R            | -             | -                | E       | R      |

E: Excelente    B: Bien    S: Satisfactorio    R: Regular    N: Nula

## FUNGICIDAS

|                        | SONG | SYREX<br>DUO |
|------------------------|------|--------------|
| <i>Fusarium</i>        | 2    | -            |
| <i>Helmintosporium</i> | 2    | 5            |
| <i>Oidio</i>           | 4    | 2            |
| <i>Rincosporium</i>    | 1    | 5            |
| <i>Roya parda</i>      | 5    | 5            |
| <i>Roya amarilla</i>   | 5    | 5            |
| <i>Septorias</i>       | 2    | 5            |

|                 |            |                     |               |           |
|-----------------|------------|---------------------|---------------|-----------|
| 5:<br>Excelente | 4:<br>Bien | 3:<br>Satisfactorio | 2:<br>Regular | 1:<br>Mal |
|-----------------|------------|---------------------|---------------|-----------|



## HERBICIDAS

|               | COMPOSICIÓN                                                                  | MODO DE ACCIÓN | CULTIVOS                                   | DOSIS                                 | Nº REG.  | P.S. | MOMENTO APLICACIÓN                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------|
| ARBITER       | Fluroxipir 20%                                                               | O              | Avena, cebada, centeno, trigo y triticales | 0,75-1 l/ha                           | 25.400   | NP   | Post-emergencia dicotiledóneas              |
| BALKAR        | Florasulam 0,625% + 2,4-D 30%                                                | O + B          | Trigo y cebada                             | 0,5-0,75 l/ha                         | ES-00198 | NP   | Post-emergencia dicotiledóneas              |
| BOUDHA        | Metsulfuron Metil 25% + Tribenuron Metil 25%                                 | B              | Avena, cebada, centeno, trigo y triticales | 15-20 g/ha                            | 25.868   | NP   | Post-emergencia dicotiledóneas              |
| BUGGY GREEN   | Glifosato 36%                                                                | G              | Herbáceas extensivas                       | Anuales 3-6 l/ha<br>Vivaces 6-10 l/ha | 25.728   | NP   | Post-emergencia malas hierbas / Pre-siembra |
| CERCO         | Bentazona 48%                                                                | C3             | Cebada, centeno, trigo                     | 2 l/ha                                | 11.317   | NP   | Post-emergencia dicotiledóneas              |
| CORCEL WG     | Tribenuron Metil 75%                                                         | B              | Avena, cebada, centeno, trigo y triticales | 20 g/ha                               | ES-00128 | NP   | Post-emergencia dicotiledóneas              |
| MILANO LQM    | Fluroxipir-metil 13,5% + Metsulfuron-metil 0,51% + Tifensulfuron-metil 3,03% | O + B          | Cebada, trigo, avena y triticales          | 0,5-1 l/ha                            | ES-00348 | NP   | Post-emergencia dicotiledóneas              |
| MOST MICRO HL | Pendimetalina 36,5 %                                                         | K1             | Trigo                                      | 1,7-3 l/ha                            | 25.730   | NP   | Pre-post emergencia temprana                |
| VERTIGO       | Diflufenican 50%                                                             | F1             | Cebada, centeno, trigo y triticales        | 0,125-0,250 l/ha                      | ES-00280 | NP   | Pre-post emergencia temprana dicotiledóneas |
| VOLCAN        | Pirafufen-etil 2,65%                                                         | E              | Cereales                                   | 0,25-0,35 l/ha                        | 23.138   | NP   | Pre-siembra                                 |

## INSECTICIDAS

|                | COMPOSICIÓN            | CULTIVOS      | DOSIS       | PLAGAS                     | Nº REGISTRO | P.S. |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|------|
| FAKIR EC       | Deltametrina 2,5 %     | Cebada, trigo | 0,5 l/ha    | Pulgones, trips y chinches | 25.700      | 30   |
| POINTER 100 CS | Lambda Cihalotrin 10 % | Cebada, trigo | 15-25 ml/hl | Pulgones y garrapattillos  | 25.624      | 28   |

## FUNGICIDAS

|           | COMPOSICIÓN                            | CULTIVOS                                   | DOSIS      | ENFERMEDADES                                                                         | Nº REGISTRO | P.S. |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| SONG      | Tebuconazol 25%                        | Cebada, trigo                              | 1 l/ha     | Rincosporium, Roya parda, Roya amarilla, Septorias, Helmintosporium, Oídio, Fusarium | 24.814      | 35   |
| SYREX DUO | Fluxapyroxad 7,5% + Piraclostrobin 15% | Avena, cebada, centeno, trigo y triticales | 1-1,5 l/ha | Helmintosporium, Rincosporium, Roya parda, Roya amarilla, Septorias, Oídio           | ES-00458    | 35   |

## BIOESTIMULANTES - NUTRICIONALES

|                    | COMPOSICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOSIS        | RECOMENDACIONES DE USO                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BLACKJAK</b>    | Extracto húmico total 25%<br>Ácidos húmicos 20,5%<br>Ácido fúlvicos 4,5%<br>pH 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 l/ha       | En mezcla con herbicidas o fungicidas en las aplicaciones realizadas en post-emergencia, para paliar el estrés provocado en el cultivo.                           |
| <b>EFFICIENT</b>   | Nitrógeno total (N): 28% p/p<br>Nitrógeno ureico (N): 11% p/p<br>Nitrógeno de urea formaldehído: 17% p/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5-10 kg/ha   | Aplicable desde ahijado hasta floración.                                                                                                                          |
| <b>MAGNOFOL</b>    | Nitrógeno nítrico (N): 6,0% p/p<br>Óxido de Magnesio (MgO) -soluble en agua-: 9,0% p/p<br>Zinc (Zn) soluble en agua: 0,16% p/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300-600 cc/h | Puede ser aplicado a finales de invierno o principio de primavera, antes o después de la floración de las plantas, y a la mitad del ciclo vegetativo del cultivo. |
| <b>STILO HYDRO</b> | Aminoácidos libres: 9,0% p/p<br>Nitrógeno (N) total: 11% p/p<br>Nitrógeno (N) orgánico: 11% p/p<br>Aminograma: Prolina 50%, Glicina 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 kg/ha      | Aplicar junto con los fungicidas como protección frente a condiciones adversas como sequía o escasa precipitación.                                                |
| <b>STILO VERDE</b> | Aminoácidos libres: 10%<br>Nitrógeno (N) total: 6,08 % p/p<br>Nitrógeno (N) orgánico: 2,71 p/p<br>Nitrógeno (N) amoniacal: 3,37 % p/p<br>Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,10 % p/p<br>Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0,10 % p/p<br>Zinc (Zn) soluble en agua : 0,10 % p/p<br>Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0,10 % p/p<br>Aminograma:<br>Ácido glutámico (73% p/p), Alanina, Ácido aspártico, Prolina, Valina, Glicina, Serina, Tirosina, Leucina, Arginina, Fenilalanina, Histidina, Isoleucina, Metionina, Hidroxiprolina, Lisina, Treonina.<br>Materia orgánica: 31% p/p<br>Carbono orgánico: 4,88 %p/p<br>Azufre (SO3): 5% p/p | 2-3 l/ha     | En mezcla con herbicidas o fungicidas en las aplicaciones realizadas en post-emergencia, para paliar el estrés provocado en el cultivo.                           |





**SIPCAM**  
IBERIA



*[www.sipcomiberio.es](http://www.sipcomiberio.es)*