


E[®]EVO

Curane[®] Evo



CURANE[®] EVO

EL LÍDER DE TU DEFENSA



- Fungicida sistémico, con movimiento ascendente y descendente.
- Alta protección de zonas en crecimiento activo.
- Activador de las autodefensas de las plantas.
- Rápida absorción.

sipcamiberia.es

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y siga las instrucciones.

SIPCAM
IBERIA

Curane[®] Evo

¿QUÉ ES?

CURANE[®] EVO es un FUNGICIDA SISTÉMICO a base de Fosfonato Potásico con elevado efecto frente a hongos Oomicetos (Mildiu, Phytophthora, Phythium, Bremia,...). Está formulado como Concentrado Soluble (SL).

CURANE [®] EVO	
MATERIA ACTIVA	Fosfonato potásico (expresado como ácido fosforoso) 51% p/v (510 g/l) Equivalente a 790 g/l de mezcla de fosfonatos potásicos
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
REGISTRO	ES-00302

¿CÓMO ACTÚA?

CURANE[®] EVO actúa inhibiendo la germinación de las esporas reproductoras del hongo. Además, induce la producción de FITOALEXINAS (sustancias de defensa naturales de las plantas).


CARACTERÍSTICAS

- Sistemía ascendente y descendente.
- Protección eficaz de las zonas en crecimiento activo.
- Clasificado dentro del Grupo FRAC P 07 (inductores de las defensas naturales en la planta huésped).
- No favorece la aparición de resistencias.
- Efecto sinérgico: aplicado en mezcla con otros fungicidas refuerza la eficacia del tratamiento.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS DE CURANE[®]EVO

Cultivo	Enfermedad	Dosis l/ha	N.º Aplic.	Interv	Vol. Caldo	Forma y época de aplicación (condiciones específicas)
Naranja	Phytophthora	1,75 a 8,75	2	20	1.000-3.500 l/ha	Aplicar a partir de BBCH>40, es decir, a partir del desarrollo total de los brotes de primavera.
Pomelo	Phytophthora	1,75 a 8,75	2	20	1.000-3.500 l/ha	Aplicar a partir de BBCH>40, es decir, a partir del desarrollo total de los brotes de primavera.
Vid	Mildiu	0,75 a 2,5	3	10	500-1.000 l/ha	Incluye vid de mesa y vinificación. Aplicar a partir de BBCH>20, es decir, a partir del final del desarrollo de las hojas y aparición de las inflorescencias.

Precauciones: no mezclar con abonos nitrogenados, cobres y aceites.





POSICIONAMIENTO TÉCNICO

VID DE VINIFICACIÓN Y UVA DE MESA

Para el control de mildiu se recomienda:

- Aplicar a partir de BBCH>20, es decir, a partir del final del desarrollo de las hojas y la aparición de las inflorescencias.
- Emplear dosis de 2 a 2,5 l/ha.
- Para aumentar eficacia del tratamiento, aplicar junto a otros productos con modo de acción por contacto y/o penetrante.



NARANJO Y POMELO

Para el control de *Phytophthora* se recomienda:

- En primavera, aplicar al final del desarrollo total de los brotes.
- Repetir aplicación en la brotación de otoño.
- En ambos casos, se recomienda una dosis de 4-7 l/ha y un volumen de caldo de 2.000 a 2.500 l/h.



 **Curane[®] Evo**