

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

ZETOR® EW

NÚMERO DE REGISTRO

ES-00159 - Denominación común del producto INVERT.

COMPOSICIÓN

Abamectina, 1,8% p/v (18 g/l).

Contiene 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica

FORMULACIÓN

Emulsión aceite en agua (EW).

DESCRIPCIÓN

Insecticida de amplio espectro.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



H302 Nocivo en caso de ingestión.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260 No respirar la niebla de pulverización.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes de protección.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.



ATENCIÓN

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5L.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización mecánica y manual a cultivos bajos (lechuga y similares, tomate, pimiento, berenjena, cucurbitáceas de piel no comestible), manual a cultivos altos y bajos (aplicaciones en invernadero en tomate, berenjena, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible y fresal) y mecánica y manual a cultivos altos (naranja, manzano, peral, melocotonero y nectarino, vid de mesa y vid de vinificación).

CULTIVO	PLAGA/EFEECTO	DOSIS	P.S.
Naranja	Ácaros eriófidos y minadores	30-40 cc/hl	10
Manzano	Ácaros	80 cc/hl	3
Melocotonero y nectarino		50-100 cc/hl	14
Peral	Ácaros eriófidos y psila	50-100 cc/hl	3
Berenjena (aire libre e invernadero)	Ácaros eriófidos y minadores	50-80 cc/hl	3
Pimiento (solo aire libre) y Tomate (aire libre e invernadero)		50-100 cc/hl	
Cucurbitáceas de piel comestible (sólo invernadero)	Ácaros y minadores	50-100 cc/hl	3
Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre e invernadero)			3 (invernadero), 5 (aire libre)
Lechugas y similares (canónigos, lechugas, escarolas y brotes tiernos incluidas las especies de Brassica)			7
Fresal (sólo invernadero)			3
Vid (vid de mesa y vid de vinificación)			Ácaros

Naranja: Aplicar desde BBCH 31-32 (empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo. Los brotes alcanzan alrededor del 20% de su tamaño final) hasta BBCH 71-74 (cuajado: el ovario empieza a crecer; se inicia la caída de frutos jóvenes; el fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final. Adquieren un color verde oscuro). Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 1000-2000 l/ha
 Núm. máx. aplicaciones por campaña: 3.

Manzano: Aplicar desde la caída de pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Intervalo de días entre aplicaciones: 15 // Volumen de caldo: 750-1200 l/ha Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2.

Melocotonero y Nectarino: Aplicar desde la caída de pétalos hasta 14 días antes de la cosecha. Volumen de caldo: 1000-1200 l/ha // Una única aplicación por campaña.

Peral: Aplicar desde la caída de pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Intervalo de días entre aplicaciones: 15 // Volumen de caldo: 750-1200 l/ha Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2

FICHA TÉCNICA

Berenjena (aire libre e invernadero), Pimiento (solo aire libre) y Tomate (aire libre e invernadero): Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha. Núm. máx. aplicaciones por campaña: 3.

Cucurbitáceas de piel comestible (sólo invernadero) y de piel no comestible (aire libre e invernadero): Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha // Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2 // Restricción del uso en invernadero durante los meses de noviembre-febrero.

Lechugas y similares (canónigos, lechugas, escarolas y brotes tiernos incluidas las especies de Brassica): Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha Núm. máx. aplicaciones por campaña: 3.

Fresal (sólo invernadero): Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha // Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2 // Restricción del uso en invernadero durante los meses de noviembre-febrero.

Vid (vid de mesa y vid de vinificación): Aplicar con infestación (excluyendo de BBCH 60 (los primeros capuchones florales separados del receptáculo) a BBCH 69 (fin de la floración)). Volumen de caldo: 500-1000 l/ha // Núm. máx. aplicaciones por campaña: 1

OBSERVACIONES

EL PREPARADO NO SE USARÁ EN COMBINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.