

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

AMID-THIN

NÚMERO DE REGISTRO

16.170

COMPOSICIÓN

ANA-AMIDA 8,2% p/p (82 g/kg)

FORMULACIÓN

Polvo mojable (WP)

DESCRIPCIÓN

AMID-THIN® es un fitorregulador para el aclareo químico del manzano. Induce la formación de una zona de abscisión en el pedúnculo del fruto. AMID-THIN® permite obtener frutos de mayor calibre y más calidad. Reduce la vecería del cultivo porque elimina los frutos pequeños antes de que estos perjudiquen la inducción floral del año siguiente.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



H361d Se sospecha que daña al feto.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P260 No respirar la niebla de pulverización.

P280 Llevar guantes y prendas de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.



ATENCIÓN

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Envases de 1kg.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZOS DE SEGURIDAD

| CULTIVO | DOSIS (g/Hl) | Nº APLICACIONES | INTERVALOS | VOL. CALDO (l/ha) | PLAZO DE SEGURIDAD (días) |
|---------|--------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Manzano | 100 | 1 | - | 1.000 | 90 |

APLICACIÓN

AMID-THIN® se aplicará mediante tractor y en pulverización abundante a alta presión, insistiendo especialmente en las partes superiores del árbol, que son las más difíciles de aclaro.

Para obtener los mejores resultados, aplicar AMID-THIN® a partir de la caída de pétalos, aproximadamente 10 días después de la plena floración (BBCH 65-71) y preferentemente al atardecer, en condiciones de humedad relativa elevada, de forma que el caldo se seque lentamente sobre el follaje evitando la rápida evaporación de las gotas de pulverización.

PRECAUCIONES DE USO

Evitar aplicaciones tardías. Tratamientos 20 días después de la plena floración pueden dar resultados insuficientes. No tratar con tiempo frío, lluvioso o demasiado cálido.

Tratar los árboles en perfecto estado sanitario y de nutrición. No mezclar con ningún otro producto fitosanitario. Preparar la cantidad de caldo necesaria para la aplicación y tratar cuanto antes.

La acción de AMID-THIN® depende de varios factores como: variedad, vigor, importancia y calidad de los polinizadores, condiciones climáticas en el momento de la fecundación, condiciones meteorológicas (antes, durante y después del tratamiento), estado de los árboles y sus antecedentes, nivel de reservas, etc. El fruticultor deberá valorar aquellos aspectos de su plantación que pueden influir sobre el resultado final. Respetando las condiciones de empleo indicadas, se reduce al mínimo el riesgo de sobreclaro.

Después del tratamiento efectuar un cuidadoso lavado de los aparatos con abundante agua, haciéndola circular por bomba, gomas y boquillas.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.