


PROPLANT (FUNGICIDAS)



Tipo de formulación:

Propamocarb 60.5% (Clorhidrato)
SL (Concentrado Soluble)

Envase:

1 L.; 5 L.

Aplicaciones autorizadas

Cultivo/Especie	Plaga/Efecto	Dosis
Berenjena, pimiento y tomate.	Pudriciones raíz/cuello.	(*)
Cucurbitáceas de piel comestible y cucurbitáceas de piel no comestible.	Pudriciones raíz/cuello.	(**)
Fresaes.	Pudriciones raíz/cuello.	(***)
Lechuga.	Mildiu.	1,5 L/Ha. (****)
Ornamentales herbáceas.	Pudriciones raíz/cuello.	(****)
Ornamentales leñosas.	Pudriciones raíz/cuello.	(*****)
Tabaco.	Pudriciones raíz/cuello.	(*****)

Condicionamiento particular

Fungicida para el control de enfermedades de raíz y de cuello producidas por *pytium*, *phitophthora*, mildiu y otros *ficomicetos*. En aplicaciones foliares, al suelo o via goteros. En cultivos, esquejes, estolones y semilleros.

(*) En aplicación al suelo preparar un caldo al 0,25-0,5% y utilizar 2-3 l. por m² o en riego por goteo o por sistema "viaflo" a 2-3 l/ha al aparecer los primeros síntomas o de manera preventiva. En aplicación dirigida al cuello preparar un caldo al 0,15% y utilizar 100 cc. por planta. En preparación de sustratos para semilleros, 0,25-0,3 l. de producto (en 8-10 l. de agua) por m³ de sustrato.

(**) En aplicación foliar al 0,2-0,3% o en mezcla con mancozeb al 0,15-0,20%. En aplicación al suelo preparar un caldo al 0,25-0,5% y utilizar 2-3 l. por m² o en riego por goteo o por sistema "viaflo" a 2-3 l/ha al aparecer los primeros síntomas o de manera preventiva. En aplicación dirigida al cuello preparar un caldo al 0,15% y utilizar 100 cc. por planta.

(***) En estolones aplicar, por inmersión en caldo al 0,3-0,5% durante 15 minutos. En aplicación al suelo preparar un caldo al 0,25-0,5% y utilizar 2-3 l. por m² y mediante riego por goteo o por sistema "viaflo" a dosis de 2-3 l/ha al aparecer los primeros síntomas o de manera preventiva.

(****) Aplicar en pulverización normal, con un máximo de 3 aplicaciones por período vegetativo a intervalos de 10 días, la primera a los 3-4 días del trasplante.

(*****) En plantas de bulbo y esquejes de clavel, aplicar por inmersión un caldo al 0,3-0,5% durante 15 minutos. En preparación de sustratos para semilleros y macetas, 0,25-0,30 l. de producto (en 8-10 l. de agua) por m³ de sustrato. En aplicaciones al suelo preparar un caldo al 0,25-0,5% y utilizar 2-3 l. por m². En aplicaciones dirigidas al cuello preparar un caldo al 0,15% y utilizar 100 cc. por planta.

(*****) En preparación de sustratos para semilleros y macetas, aplicar 0,25-0,30 l. de producto (en 8-10 l. de agua) por m³ de sustrato. En aplicaciones al suelo preparar un caldo al 0,25-0,5% y utilizar 2-3 l. por m². En aplicaciones dirigidas al cuello preparar un caldo al 0,15% y utilizar 100 cc. por planta. Advertir en la etiqueta que la aplicación de caldos de concentración superior al 0,25% puede presentar riesgos de fitotoxicidad en ciertas especies si el tratamiento alcanza las hojas del cultivo.

(******) En aplicación al suelo preparar un caldo al 0,25-0,5% y utilizar 2-3 l. por m². En preparaciones de sustratos para semilleros 0,25-0,3 l. de producto (en 8-10 l. de agua) por m³ de sustrato.