

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

LOGRADO®360

NÚMERO DE REGISTRO

25.778

COMPOSICIÓN

Glifosato 36% p/v (360 g/l) en forma de sal potásica.

FORMULACIÓN

Concentrado soluble (SL).

DESCRIPCIÓN

LOGRADO® 360 es un herbicida sistémico, no residual, para control en postemergencia de las malas hierbas anuales y perennes.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

H319 Provoca irritación ocular grave.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261 Evitar respirar la niebla.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes y prendas de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P391 Recoger el vertido.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 20L.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos herbicidas para control de malas hierbas anuales y perennes en pre-siembra de cultivos herbáceos (trigo, avena y cebada), cultivos leñosos de porte no rastrero de más de 3-4 años, en aplicación dirigida, barbechos y parcelas agrícolas no cultivadas, renovación de praderas, márgenes de parcelas, muros de contención de arrozales y acequias.

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Calibre el equipo correctamente, calcule el volumen de caldo que vaya a aplicar por hectárea, de acuerdo al caudal de la boquilla (l/min), la velocidad y ancho de trabajo, con especial cuidado en la uniformidad de la distribución del caldo. La cantidad de producto y el volumen de caldo de aplicación deberá ser el adecuado para el área de tratamiento, respetando las dosis indicadas. Llenar hasta la mitad con agua el depósito donde se prepara el caldo de aplicación. Añadir la cantidad necesaria de **LOGRADO® 360** según la tabla siguiente. Completar con el agua necesaria, agitando siempre. Para reducir el riesgo de deriva evitar presiones superiores a 2 kg/cm² y emplear boquillas anti-deriva.

CULTIVOS	PULVERIZADORES ACCIONADOS POR TRACTOR	PULVERIZADORES MANUALES
	Volumen del caldo 200-400 l/ha Dosis de LOGRADO® 360 en l/ha	Volumen de caldo 400 l/ha* Dosis de LOGRADO® 360 en ml/l caldo
Aplicaciones en presiembra de cultivos herbáceos (trigo, avena y cebada)	Hierbas anuales de hoja estrecha en estado de crecimiento precoz	Hierbas anuales de hoja estrecha en estado de crecimiento precoz
Barbechos y parcelas agrícolas no cultivadas	1,5 l/ha	5 ml/l caldo
Cultivos leñosos (cítricos, frutales de hueso y pepita, olivo, viñedo, platanera)	Malas hierbas anuales	Malas hierbas anuales
Renovación de praderas	3,0 - 6,0 l/ha	7,5 ml-15 ml/l caldo
Márgenes de parcelas, muros de contención de arrozales y acequias	Malas hierbas perennes	Malas hierbas perennes
	6,0 - 10,0 l/ha	15-25 ml/l caldo

* En caso de emplear otros volúmenes de caldo ajustar la dosis de producto formulado convenientemente.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Tratar con agua limpia, en días sin viento, y dirigiendo la pulverización de forma que no alcance las plantas cultivadas y partes verdes del cultivo (hojas, ramas, o frutos, o las raíces en el caso de la platanera). En cultivos leñosos, dirigir la pulverización sobre las malas hierbas en plantaciones con más de 3-4 años y con troncos bien lignificados. No aplicar cuando se prevé lluvia en las 6 horas siguientes a la aplicación. Para un buen control de las especies perennes no movilizar el suelo en la primera semana tras la aplicación, y para un buen control de las anuales durante las primeras 48 horas tras la aplicación. En acequias, aplicar sólo en los márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. En praderas o pastizales, usar sólo en aplicaciones puntuales contra malezas leñosas o cuando se pretenda la regeneración. En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha realmente tratada y un plazo de seguridad de 14 días. No mezclar, almacenar o aplicar **LOGRADO® 360** en recipientes galvanizados o de acero sin revestimiento.

GESTIÓN DE RESISTENCIAS

Se han identificado algunos biotipos de *Conyza* y *Lolium* resistentes a las dosis recomendadas de glifosato. Las áreas con estos biotipos deben ser gestionadas adecuadamente (antes de que estas malezas produzcan semillas), usando otros tipos de herbicidas autorizados o mediante labores o prácticas

FICHA TÉCNICA

culturales. Rogamos consulte a su distribuidor o a un representante de la compañía para mayor información.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

GRUPO G HERBICIDA

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.