



PRINCIE®

INSECTICIDA SISTÉMICO

Para aplicación en pulverización
foliar y en agua de riego





CARACTERÍSTICAS

Neonicotinoide con actividad insecticida por vía sistémica y residual. Actúa por contacto e ingestión y es absorbido tanto por vía radical como por las hojas, pudiendo ser aplicado en pulverización foliar o al suelo, al fondo del surco en el momento de la siembra o durante el cultivo diluido en el agua de riego.

COMPOSICIÓN

Imidacloprid 20% p/v. SL. Concentrado soluble.

CULTIVOS Y DOSIS AUTORIZADAS

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES	P. S.
Albaricoquero	gusano cabezudo	0,05-0,075 %	Aplicar únicamente después de la floración	15 días
	minadores de hojas			
	mosquito verde			
	pulgones			
Alcachofa	pulgones	0,5 l/ha	Efectuar como máximo 2 aplicaciones espaciadas 21 días	3 días
Almendro	gusano cabezudo	0,05 %	Efectuar una única aplicación en primavera, después de la caída de los pétalos, con un máximo de 0,5 l/ha. en pulverización normal	NP
	pulgones	0,05 %		
Apio	pulgones	0,4-0,5 l/ha	Aplicar en pulverización normal, con un máximo de dos aplicaciones con un intervalo de 10-15 días al inicio del ataque de pulgones	3 días
Berenjena	mosca blanca	0,075 %	Como máximo, 4 aplicaciones espaciadas 14 días. En agua de riego, a la dosis de 500-700 cc/ha	3 días
	pulgones	0,05-0,075 %	Como máximo, 4 aplicaciones espaciadas 3 días. En agua de riego, a la dosis de 500-700 cc/ha	
Brécol	mosca blanca	0,075 %	En pulverización y en agua de riego, no pasar de 0,5 l/ha, máximo 2 aplicaciones por campaña	14 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Castaño de Indias	minador	0,05-0,075 %	Aplicar únicamente después de la floración	NP
Cerezo	gusano cabezudo	0,05 %	Aplicar únicamente después de la floración	28 días
	mosquito verde			
	orugas minadoras			
	pulgones			
Ciruelo	tigre del cerezo			
	gusano cabezudo	0,05 %	Aplicar únicamente después de la floración	21 días
	mosquito verde			
Cítricos	pulgones			
	mosca blanca	0,075 %	Aplicar en pulverización normal solo después de la floración	30 días
	phyllocnistis	ver nota	*	
	pulgones	0,05-0,075 %	Aplicar en pulverización normal solo después de la floración	
Coliflor	ceratitis	0,05 %		3 días
	mosca blanca	0,075 %	En pulverización y en agua de riego, no pasar de 0,5 l/ha, máximo 2 aplicaciones por campaña	14 días
Cucurbitáceas	pulgones	0,05-0,075 %		
	mosca blanca	0,075 %	Solo en cultivos de invernadero. En pulverización y en agua de riego, no pasar de 500-700 cc/ha	3 días
Frutales de pepita	minadores de hojas	0,05-0,075 %	Aplicar únicamente después de la floración	15 días
	psilidos			
	pulgones			
Judía verde	mosca blanca	0,075 %	Solo en cultivos de invernadero. En pulverización y en agua de riego, no pasar de 500-700 cc/ha	3 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Lechuga	mosca blanca	0,075 %	En pulverización foliar, máximo 2 aplicaciones por campaña y, en agua de riego, una sola aplicación en transpalante a la dosis de 500-700 cc/ha	7 días
	pulgones	0,05-0,075 %		

* En pulverización normal, aplicar a dosis de 0,05%. Sin diluir, aplicar en el tronco o chapa de injerto mediante el equipo adecuado a la dosis de 1 cc/árbol (plantón e injerto de 1 año), 2 cc/árbol (plantón e injerto de 2 años) y 3 cc/árbol (plantón e injerto de 3 años). No aplicar en pulverización en el período comprendido entre el 1° de abril y el 1° de julio a fin de no perjudicar al artrópodo útil *Rodolia cardinalis*. No tratar en parcelas con presencia de cochinilla acanalada. Aplicar siempre después de la floración.



EFFECTIVIDAD

Resulta efectivo en el control de mosca blanca, mosquito verde, pulgones, psílidos, fillocnistis, minadores de hojas y otros microlepidópteros, escarabajo, tropinota y otros insectos.

ADEVERTENCIA

Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplique durante la floración de los cultivos ni tratar en sus áreas ni épocas de actividad.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES	P. S.
Lúpulo	pulgones	0,05%		35 días
Melocotonero	gusano cabezudo	0,05-0,075 %	Aplicar únicamente después de la floración	15 días
	minadores de hojas	0,05-0,075 %		
	mosquito verde	0,05-0,075 %		
	pulgones	0,05-0,075 %		
	tropinota	0,05-0,075 %		
Nectarino	gusano cabezudo	0,05-0,075 %	Aplicar únicamente después de la floración	15 días
	minadores de hojas	0,05-0,075 %		
	mosquito verde	0,05-0,075 %		
	pulgones	0,05-0,075 %		
Olivo	mosca	ver nota	**	7 días
	saissetia	0,05 %	Un máximo de 2 aplicaciones espaciados 30 días sin superar 0,4 l/ha Siempre después de floración	
Ornamentales herbáceas	mosca blanca	0,075 %	Sólo en cultivos de invernadero	NP
	pulgones	0,05-0,075 %		
Ornamentales leñosas	mosca blanca	0,075 %		NP
	pulgones	0,05-0,075 %		
Palmáceas ornamentales	taladros	0,05-0,075 %	***	NP
Patata	escarabajo	0,05-0,075 %		30 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Pimiento	mosca blanca	0,075 %	Tambien en agua de riego a 500-700 cc/ha	3 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Repollo	mosca blanca	0,075 %	En pulverización y en agua de riego, no pasar de 0,5 l/ha, máximo 2 aplicaciones por campaña	28 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Tabaco	mosca blanca	0,075 %		15 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Tomate	mosca blanca	0,075 %	Tambien en agua de riego a 500-700 cc/ha	3 días
	pulgones	0,05-0,075 %		
Vid	cicadelidos	0,05 %	Efectuar una única aplicación con un máximo de 0,5 l/ha después de floración. En volúmenes de de caldo bajo deberá asegurarse la dosis de 0,35 l/ha	14 días
	melazo			
	pulgones			

** Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,05% con un máximo de 2 tratamientos/año o en pulverización-cebo a dosis de 50-100 cc/ha diluidos en 50-100 l/ha en mezcla con 1-2% de proteína hidrolizada. Máximo 4 aplicaciones por campaña espaciadas de 7 a 10 días, en pulverización mediante parcheo con gota gruesa preferiblemente en la cara sur. El tratamiento en olivar deberá realizarse únicamente con uno de los métodos autorizados. En caso de realizar la pulverización cebo, no podrá tratarse en la misma campaña en pulverización normal y viceversa. Tratar únicamente después de la floración.

*** Aplicar en pulverización normal al cogollo y estípites de la planta (previa eliminación de las inflorescencias para ajustarse al Reglamento UE 485/2013) a la dosis indicada o, en el caso de palmáceas en vivero, aplicar mediante el riego por goteo a una dosis de 8-10 l/ha de producto, con un máximo de dos aplicaciones espaciadas 30-40 días. Mediante inyección al tronco, cada 45-55 días de marzo a noviembre, con una dosis de 4-10 ml/aplicación a 1,5-2 m de la corona de hojas. La aplicación se efectuará por empresas especializadas, pudiéndose aplicar en el ámbito de parques y jardines.

PRINCIPALES PLAGAS DIANA DE PRINCIE®

- INSECTOS CHUPADOPRES: MOSCA BLANCA, PULGONES Y PSILA
- MINADORES DE HOJA: DE CÍTRICOS Y FRUTALES
- ESCARABAJO DE LA PATATA
- PICUDO DE LAS PALMERAS

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.)



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
C/ Viladomat, 321, 5º planta-08029 Barcelona
Tel.: 934 952 500 - Fax: 934 952 502
E-mail: massoagro@cqm.es
www.massoagro.com