SIPCAM IBERIA
Prof. Beltrán Báguena, 5. 46009 VALENCIA SPAIN
TEL.+34 963 483 500 / FAX.+34 963 482 721
info@sipcam.es / sipcamiberia.es

Hoja informativa

Frupica

Fungicida selectivo antibotritis

Composición: Mepanipirim 50% p/p (500g/kg)
Formulación: Polvo Mojable
Envases: 0,1 kg - 1 kg (2x0,5)HS

Nº Registro: 22.310

CARACTERÍSTICAS

Es activo sobre el crecimiento micelial, afectando a la elongación del tubo germinal y formación de haustorios u órganos de succión del hongo. Perteneciente al nuevo grupo químico de las anilinopirimidinas. Eficaz contra razas de *Botrytis cinerea* Pers. resistentes a los fungicidas dicarboximidicos.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar en pulverización normal. Con la finalidad de evitar problemas de resistenciaen el control de la podredumbre gris (*Botrytis cinerea* Pers.), no deberá aplicarse más veces de las aconsejadas en cada ciclo vegetativo, alternando con otros fungicidas contra *Botrytis cinerea* Pers. con mecanismos de acción diferentes a esta anilinopirimidina.

Debe asegurarse que la pulverización sea completa, homogénea y uniforme, cubriendo toda la vegetación.

No deberá aplicarse por medios aéreos. La aplicación se realizará mediante tractor en cultivos bajos que no sobrepasen 1 metro de altura y en invernadero mediante instalaciones fijas de pulverización automatizadas.

Fresales: realizar sólo 1 aplicación por campaña.

ÉPOCA DE EMPLEO

Vid: puede aplicarse a la caída de pétalos, al cierre del racimo, al cambio de color ó 3 semanas antes de cosecha, siempre de forma preventiva antes de la aparición de la infestación. Deberá hacerse sólo una aplicación por

campaña.

Fresales: Tratar al principio de la floración. Se puede realizar un segundo tratamiento, espaciado 7-10 días del primero, realizando, al máximo, dos aplicaciones por campaña.

Tomate y Berenjena: Comenzar en el momento de la floración y continuar en intervalos de 15 días, realizando, como máximo, dos aplicaciones seguidas.

APLICACIONES AUTORIZADAS	PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS)	ENFERMEDADES	DOSIS
Berenjena	3	Botritis	0,8 kg/ha
Fresales	3	Botritis	0,8 kg/ha
Tomate	3	Botritis	0,8 kg/ha
Uva de mesa	21	Botritis	1 kg/ha
Vid de vinificación	21	Botritis	1 kg/ha

Excepto parrales de vid.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las masas de agua superficial.
Para proteger los artrópodos no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta la zona no cultivada.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

MSDS Frupica 2016 (Hoja de seguridad)
Dossier Fungicidas Viña (Otros)
Boletín Técnico Frupica 2012 (Otros)