

VENTAJAS

- ▶ Rapidez de acción
- ▶ Su acción multipunto EVITA LA APARICIÓN DE RESISTENCIAS
- ▶ Recomendado contra Oidio y Black rot
- ▶ Elevada acción secundaria contra:
 - ▶ Ácaros
 - ▶ Acción repelente del azufre sobre otras plagas importantes (trips, empoasca,...)
- ▶ Ambas materias activas están admitidas en los principales programas de PRODUCCIÓN INTEGRADA
- ▶ Respeto la fauna útil



oidio en hojas



oidio en racimo



oidio en sarmiento

TRATAMIENTOS RECOMENDADOS

ESTADIO	D - E Hojas extendidas	G Racimos separados	H Botones florales separados	I Floración	Granos tamaño guisante	Envero
PRODUCTO Y DOSIS	MASSOCUR® COMBI			AZUFRE ESPOL- VOREO	MASSOCUR® COMBI	AZUFRE ESPOL- VOREO
	2,5 Kg/ha	3 Kg/ha	3 Kg/ha		4 Kg/ha	

Dosis en pulverización normal: 0,4 - 0,8 % (400 - 800 g/hl)

En variedades menos sensibles o con menor presión de la enfermedad podemos evitar el tratamiento en G.

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

	ENFERMEDAD	ÉPOCA DE TRATAMIENTO	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
VID	OIDIO BLACK ROT Y FRENANTE DE ÁCAROS	ANTES DE FLORACIÓN	2,5 - 3	Las dosis a aplicar dependen sobre todo del estadio vegetativo de la planta y del riesgo de aparición de la enfermedad.
		DESPUÉS DE FLORACIÓN	3 - 4	

Plazo de seguridad: 21 días.



Otras aplicaciones autorizadas de **MASSOCUR® COMBI**:

Frutales de hueso y pepita


- ▶ Tomate
- ▶ Pimiento
- ▶ Cucurbitáceas
- ▶ Fresaes
- ▶ Remolacha

Ver etiqueta

Distribuidor:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 | Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es
www.massogro.com



MASSOCUR® COMBI

FUNGICIDA SISTÉMICO Y
DE CONTACTO CONTRA
OIDIO Y BLACK ROT

FRENANTE DE ÁCAROS

