



envidor®

envidor®

- ✓ Acción por contacto, con limitado efecto de choque (dependiendo de la temperatura, la eficacia completa se alcanza entre los 7 y los 15 días).
- ✓ Importancia de un tratamientos de calidad: cubrir todas las partes infestadas de la planta.
- ✓ Alta persistencia de control de la plaga.
- ✓ Selectivo sobre la mayoría de organismos auxiliares.
- ✓ Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Más calibre y más sabor

=

fruta con más valor



Science For A Better Life

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C./ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)

www.cropscience.bayer.es



Con **envidor**[®] los ácaros, ni arrimarse

Envidor[®] el nuevo acaricida de frutales y uva de mesa, fruto de la investigación de Bayer

Composición: Spirodiclofen 24 %

Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)


Familia química: Derivados ácidos tetrónicos

Modo de acción: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos (IBL) (IRAC23)

Vía de acción: Ingestión y contacto sobre huevos, formas juveniles y adultos

Las principales ventajas de **Envidor[®]** son:

✓ Nuevo modo de acción:

* Huevos	Afecta el desarrollo embrionario.		
* Formas juveniles	Móviles: Mueren en el siguiente estadio quiescente.	Teleiocrisálida no tratada	Teleiocrisálida tratada con Envidor[®]
	Quiescentes: mueren en el mismo estadio.		
* Hembras adultas	Reducción de la fecundidad y fertilidad.		
	Acumulación de la puesta dentro de abdomen.	Hembra no tratada	Hembra tratada con Envidor[®]

✓ Nueva herramienta para las estrategias anti-resistencias:


Gracias a su mecanismo de actuación, diferente al resto de acaricidas registrados en estos cultivos, **Envidor[®]** es una excelente herramienta para la gestión de las resistencias de las distintas especies de ácaros a los acaricidas.

✓ Alta eficacia:

Envidor[®] muestra una eficacia excelente para las distintas especies de ácaros fitófagos de los frutales y la vid:

Ácaros Tetránquidos	Ácaros eriófidios
<i>Panonychus ulmi</i> (araña roja)	<i>Aculus</i> sp. (ácaro del plateado o emplomado del melocotonero)
<i>Tetranychus</i> spp. (araña roja)	<i>Epitrimerus pyri</i> (Ácaro de la roña del peral)
<i>Eotetranychus</i> spp. (araña amarilla)	<i>Calepitrimerus vitis</i> (acariosis de la vid)
	<i>Colomerus vitis</i> (eriosis de la vid)


Eficacia **Envidor[®]** contra *Tetranychus urticae* en ciruelo



✓ Elevada persistencia:

Envidor[®] es un acaricida que actúa por contacto, con un limitado efecto de choque. Esto queda sobradamente compensado por una larga persistencia en el control de ácaros:

Eficacia **Envidor[®]** contra *Panonychus ulmi* en manzano



✓ Sin problemas en la exportación:

Envidor[®] tiene LMR's autorizados en toda Europa y la mayoría de países del mundo.

✓ Registro y recomendaciones de uso:

Recomendamos la aplicación de Envidor[®] de forma preventiva o al inicio de los ataques: de esta manera, evitamos la presencia de ácaros durante los primeros días después de la aplicación, hasta que el producto haga efecto en el ácaro.

Registro: (para más detalles, leer detenidamente la etiqueta)

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo Seguridad
Albaricoque, Cerezo, Ciruelo, Manzano, Peral, Melocotonero/Nectarino, Uva de mesa y vinificación	Ácaros	0,04%(máx 0,6L/ha)	14 días

Una aplicación por campaña