

THIOCUR® COMBI

THIOCUR® COMBI

THIOCUR® COMBI



- Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Evítase el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de incendio y/o explosión no respire los humos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de inges tión: No provoque el vómito.
- Atención: Distress respiratorio por aspiración.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la tensión arterial.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Contraindicación: Depresores centrales y compuestos relacionados.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono: 91 562 04 20.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO, POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

CONSERVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN, EN LUGAR FRESCO Y BIEN VENTILADO.

Peligrosidad para la fauna:

- MAMÍFEROS: Baja, Categoría A.
 - AVES: Baja, Categoría A.
 - PECES: Baja, Categoría A
- Compatible con abejas.

FUNGICIDA ANTIOIDIO, MOTEADO Y OIDIOPSIS CON ACCIÓN FRENANTE CONTRA ÁCAROS

COMPOSICIÓN: Miclobutanil 0,8%p/p (8 gr/kg); Azufre 50%p/p (500 gr/kg) en forma de polvo mojable (WP)

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 19194/14 por Dow Agrosiences Ibérica S.A.
Cerro del Castañar, 72-B • 28034 MADRID - Tel. 91 740 77 00



Lote Nº:

Fecha de fabricación:

PARA: VID, FRUTALES DE PEPITA, ALBARICOQUERO, MELOCOTONERO, NECTARINO, CIRUELO, CUCURBITÁCEAS, FRESALES, TOMATE, PIMIENTO, REMOLACHA AZUCARERA



e 1 Kg

**LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES**

CARACTERÍSTICAS

THIOCUR® COMBI es un fungicida de aplicación foliar con acción preventiva, curativa y erradicante contra el oidio, el moteado y la oidiopsis. Actúa por contacto, vapor y sistemia. Frena el desarrollo de la araña roja y de los ácaros eriofidos (acariosis, erinosis, seca).

USOS AUTORIZADOS

THIOCUR® COMBI controla el oidio de la vid, el oidio y moteado de los frutales de pepita, el oidio de la remolacha azucarera, de las cucurbitáceas, del fresón y de los frutales de hueso y la oidiopsis de tomate y pimiento.

DOSIS

- **Viñedo y parral de vid:** 0,4-0,8 kg/hl (2,5 a 4 kg/ha).
- **Frutales de pepita:** 0,4-0,8 kg/hl.
- **Albaricoquero, Ciruelo, Melocotonero, Nectarino:** 0,4-0,8 Kg/hl.
- **Cucurbitáceas y fresales:** 0,4-0,8 kg/hl (4 a 6 kg/ha mínimo).
- **Tomate, pimiento:** 0,4-0,8 kg/hl (6 a 8 kg/ha mínimo).
- **Remolacha azucarera:** 5-7 kg/ha.

MODO DE APLICACIÓN

THIOCUR® COMBI, puede utilizarse por pulverizador o atomizador, respetando la dosis y mojando bien las partes a proteger. En aplicación preventiva, el intervalo entre tratamientos será de unos 14 días (21 días en remolacha). En caso de aplicación erradicante, el intervalo se reducirá a unos 7 días hasta que el desarrollo de la enfermedad esté controlado.

PRECAUCIONES

- Observar precauciones en cultivos de frutales sensibles (como albaricoqueros y cucurbitáceas).
- No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.
- No efectuar tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al del **THIOCUR® COMBI**.
- Para evitar posibles problemas de aparición de cepas resistentes al oidio, se aconseja alternar su uso con fungicidas de otras familias químicas.

COMPATIBILIDAD

No debe mezclarse con aceites minerales ni productos de reacción alcalina. Antes de mezclar con cualquier producto fitosanitario se aconseja realizar una pequeña prueba.

PLAZO DE SEGURIDAD

- **Vid:** 21 días.
- **Frutales de pepita y remolacha azucarera:** 28 días.
- **Albaricoquero, ciruelo, melocotonero, nectarino, fresales:** 7 días.
- **Cucurbitáceas, tomate, pimiento:** 5 días.

En cultivos con fruto destinado a conserva el plazo de seguridad para la recolección será de 45 días.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Fabricado por: Dow Agrosiences Ibérica, S.A.

© Marca registrada de Dow Agrosiences.

Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es