



Xn

- Nocivo por ingestión.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar la nube de pulverización.
- Evítese el contacto con los ojos.
- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

Nocivo

- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible muéstrela la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20.



N

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Mitigación de riesgos medioambientales:

- Mamíferos: Categoría A.
- Aves: Categoría A.
- Peces: Categoría C. Muy peligroso para peces.
- Abejas: compatible con abejas.

Peligroso para el medio ambiente

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON ESTE PRODUCTO NI CON SU ENVASE (NO LIMPIAR EL EQUIPO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO CERCA DE AGUAS SUPERFICIALES. EVÍTESE LA CONTAMINACIÓN A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LAS EXPLOTACIONES O DE LOS CAMINOS.)

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

HERBICIDA SELECTIVO DE PRE Y POSTEMERGENCIA

ECLIPSE® 70 WG



PARA: PATATA, TOMATE, ESPÁRRAGO, ALFALFA, CAÑA DE AZÚCAR, GLADIOLO, CEBADA Y TRIGO

Composición: METRIBUZIN 70% p/p (700 g/Kg), en forma de gránulos dispersables (WG).

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº. 22.065/11 por MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, S.A.
C/ San Vicente Mártir, 16 - 46002 Valencia (España) - Tel. 96 351 95 34

Lote nº:

Fecha de fabricación:



CONTENIDO NETO:

e **1 Kg**
(2 x 500 g)

**LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
PROHIBIDA LA VENTA DE LA BOLSA SIN SU CAJA DE ENVASE**

CARACTERÍSTICAS

ECLIPSE® 70 WG es un herbicida selectivo que actúa por absorción radicular y foliar contra malas hierbas anuales, gramíneas y dicotiledóneas, en preemergencia o postemergencia precoz de las mismas, en varios cultivos.

APLICACIONES, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Patata: En preemergencia (mejor poco antes de la emergencia de los tallos). Puede aplicarse en las variedades Quenebec, Red Pontiac, Desireé, Arran Barner, Palovan, King Edward, Etoile de León, Claudia, Herder, Ostara, Royal Kidney y Spunta (otras variedades consultar.)
Dosis en patata: 0,75 kg/Ha.

- Tomate: Aplicar en preplantación o en postemergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra.
Dosis en tomate: 0,75 kg/Ha.

- Espárrago: Después del acaballonado y antes de la brotación de los espárragos.
Dosis en el espárrago: 0,75 kg/Ha.

- Alfalfa: En cultivos de más de dos años y durante el reposo invernal, antes de la brotación.
Dosis en alfalfa: 0,75 kg/Ha.

- Caña de azúcar: Después del acaballonado del cultivo en pre o postemergencia del mismo.
Dosis en caña de azúcar: 0,75 kg/Ha.

- Gladiolo: Después de la plantación de los bulbos y antes de la emergencia de las plantas.
Dosis en gladiolo: 0,75 kg/Ha.

- Cebada y trigo de ciclos largos: En preemergencia o postemergencia a partir de la tercera hoja del cereal. A la dosis autorizada en cereal puede no tener un buen control en gramíneas en cuyo caso puede mezclarse con otro herbicida, como Isoproturon o similar.
Dosis en cereal: 0,1 kg/Ha (100g/Ha).

- Hacer una papilla previa e incorporar posteriormente al resto de agua.
- Aplicar al suelo en pulverización a baja presión en 400-500 litros de caldo por Ha.
- No utilizar en suelos muy arenosos. En suelos con alto contenido en materia orgánica puede disminuir la acción residual del producto.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Marca registrada y producto fabricado por:

Feinchemie Schwebda GmbH
(ALEMANIA)



Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat 321 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es