

# SET FRUIT<sup>®</sup>

PASTILLAS  
REGULADOR DE CRECIMIENTO

**Advertencia:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.**

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (no limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas o de los caminos).

**ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.**



# SET FRUIT<sup>®</sup>

PASTILLAS  
REGULADOR DE CRECIMIENTO

**COMPOSICIÓN:** 9% p/p de ácido giberélico (GA3), en pastillas solubles de 10 gramos. Cada una contiene 0,9 gr. de ácido giberélico.

Inscrito en el ROPF con el nº 17873/10



Lote nº:

Fecha de fabricación:

**LEER ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**IM** **MASSÒ**  
DIVISIÓN AGRO

**CONTENIDO: 100g<sup>e</sup>**  
(10 pastillas de 10 gr)

# SET FRUIT<sup>®</sup>

PASTILLAS  
REGULADOR DE CRECIMIENTO

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Usen indumentaria protectora adecuada.
- **En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, méstrele la etiqueta).**

## ANTÍDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MÉDICO EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

### Síntomas de intoxicación:

• Irritación de ojos y mucosas, la exposición continuada puede producir efectos sensibilizantes sobre la piel.

### Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave la piel y los ojos con agua abundante.
- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

### Recomendaciones al médico:

- Si ha ingerido, practique lavado gástrico. Sulfato sódico como purgante.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Tel. 91 562 04 20.

# SET FRUIT<sup>®</sup>

PASTILLAS  
REGULADOR DE CRECIMIENTO

## DOSIS Y APLICACIONES AUTORIZADAS

**Limonero y clementino sin hueso:** Para inducir el cuajado y la fijación del fruto. Tratar a la caída de pétalos y repetir el tratamiento a las 3-4 semanas. Dosis: 8 pastillas en 1000 lts. de agua.

- **Clementino y otras mandarinas:** Para evitar la caída de frutos. Tratar a la caída de pétalos y repetir a las 3-4 semanas. Dosis: 8 pastillas en 1000 lts. de agua.

- **Peral (var. Blanquilla):** Para reducir la caída del fruto durante el cuajado y evitar daños producidos por heladas. Tratar con el 30-60% de flor abierta o a las 48 horas para evitar el efecto de la helada. Dosis: 12 pastillas en 1000 lts. de agua.

- **Vid (var. Macabeo):** Para inducir el alargamiento del racimo y de los pedúnculos del fruto. Aplicar antes de la caída de los capuchones florales. Dosis: 12 pastillas en 1000 lts. de agua.

- **Fresal:** Para favorecer el cuajado y el crecimiento del fruto. Tratar un poco antes del inicio de floración. Dosis 12 pastillas en 1000 lts. de agua.

- **Alcachofa:** Para inducir el crecimiento y precocidad de la cosecha. Tratar al inicio de la fructificación. Dosis: 8 pastillas en 1000 lts. de agua.

## IMPORTANTE

Tratar a alto volumen de agua (600-1500 lts./ha). Es conveniente la adición de mojanete para asegurar la fijación y penetración del producto.

**PLAZO DE SEGURIDAD:** 15 días.

## PRECAUCIONES

Una vez preparada la solución aplicarla antes de 24 horas. Si llueve a las 8 horas siguientes al tratamiento, la eficacia puede disminuir sensiblemente.

**SET FRUIT<sup>®</sup> PASTILLAS** es incompatible con productos que tengan cloro libre.

## Mitigación de riesgos medioambientales:

- Mamíferos: Categoría A
- Peces: Categoría A
- Aves: Categoría A
- Abejas: Compatible con abejas.

Producto registrado por: **FINE AGROCHEMICALS, LTD.**  
Hill End House - Whittington - WR52RQ Worcester REINO UNIDO

Producto fabricado por:

**IM** **MASSÒ**

**COMERCIAL QUÍMICA MASSÒ, S.A.**  
Viladomat, 321, 5<sup>ª</sup> - 08029 BARCELONA  
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02  
E-mail: masso@cqm.es