

SPONSOR[®] MZ

FUNGICIDA ANTIMILDIU SISTÉMICO Y DE CONTACTO

Composición: Metalaxil 8% p/p (80 g/kg), Mancozeb 64% p/p (640 g/kg) en forma de polvo mojable (WP).

Inscrito en el Registro de productos fitosanitarios con el nº 21.748

Lote nº y fecha de fabricación:
Ver impreso en el envase



PARA: PATATA, VIÑEDO, PARRAL, PEPINO, SANDÍA, MELÓN, BRÉCOL, COLIFLOR, REPOLLO, TABACO Y CEBOLLA

CONTENIDO NETO:

5 Kg



**LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.**

SPONSOR® MZ



ATENCIÓN

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P261 Evitar respirar el polvo/ aerosol.
P280 Llevar guantes de nitrilo y mono de trabajo.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Puede provocar sensibilización.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO.
- Puede provocar broncoespasmo.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Puede provocar obstrucción intestinal.
- Puede producir lesión ocular.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS

Mitigación de riesgos medioambientales:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos y 20 m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

Titular y fabricante del producto:

ALINTRA, S.A., Garbí 3, P.I. Can Volart, 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - Tel. 93 593 74 41

® Marca registrada por COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona.

Producto distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es

CARACTERÍSTICAS: SPONSOR® MZ es un fungicida sistémico y de contacto compuesto por dos materias activas: **Metalaxil** y **Mancoceb**.

DOSIS DE EMPLEO

- **Patata:** Aplicar a la dosis de 0,2 a 0,3% contra Mildiu, Alternaria y Antracnosis. No realizar más de 3 tratamientos por campaña, prosiguiendo si fuera necesario con fungicidas de contacto como **COBRELINE®**, etc.

- **Patata, cebolla y cucurbitáceas:** El intervalo entre tratamientos será de 14 días, reduciéndose a 10 en casos de fuerte presión de la enfermedad. El intervalo entre el último tratamiento con **SPONSOR® MZ** y un posterior producto de contacto será inferior a 7 días.

- **Viñedo y parral:** Aplicar a dosis de 0,2 a 0,3% según desarrollo de la vegetación contra Mildiu.

Utilizar **SPONSOR® MZ** en los períodos de máximo riesgo, completando el programa con otros productos como **COBRELINE®** o **DICONOX®**. El último tratamiento con **SPONSOR® MZ** se dará a los 14 días del final de la floración.

El intervalo entre tratamientos será de 14 días, reduciéndose a 10 en casos de fuerte presión de la enfermedad. El intervalo entre el último tratamiento con **SPONSOR® MZ** y un posterior producto preventivo se establece en un máximo de 10 días.

- **Pepino, sandía, melón, cebolla, brécol, coliflor y repollo:** Aplicar a la dosis de 0,2 a 0,3% contra Mildiu.

- **Tabaco:** Aplicar a la dosis de 0,2 a 0,3% según desarrollo, contra Moho azul. (En semilleros aplicar a 0,3% cada 7 días).

• **Tabaco en semillero:** El intervalo entre tratamientos será de 7 días.

• **Tabaco en campo:** El intervalo entre tratamientos será de 10 días.

PLAZO DE SEGURIDAD: Entre el último tratamiento y la recolección deberán transcurrir:

- **Patata, cebolla, pepino, sandía, melón, brécol, coliflor, repollo y tabaco:** 21 días.

- **Vid:** En vid no procede establecer plazo de seguridad por darse el último tratamiento a los 14 días del final de la floración.

MODO DE EMPLEO: Añadir agitando, evitando la formación de grumos, la cantidad necesaria de producto sobre un pequeño volumen de agua y mezclar esta papilla con el resto del líquido. Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar restos para aplicaciones posteriores.

COMPATIBILIDADES: SPONSOR® MZ es compatible químicamente con la mayoría de insecticidas, fungicidas, etc., utilizados en agricultura excepto con los productos de reacción alcalina. En cuanto a compatibilidad física, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba previa o consultar con el Departamento Técnico.

OBSERVACIONES: Debido a la imposibilidad de poder prever la aparición de fenómenos de resistencia. ALINTRA, S.A. no asume ninguna responsabilidad derivada de la presencia de cepas resistentes a metalaxil.

A las dosis recomendadas, **SPONSOR® MZ** no presenta problemas de tolerancia por parte del cultivo.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.