

WELGRO[®]

BORO SG

CORRECTOR DE CARENCIAS DE BORO (B)

CARACTERÍSTICAS

WELGRO[®] BORO SG, a base de pentaborato sódico, es un corrector de carencias de boro para prevenir o corregir las deficiencias de este elemento. El producto puede aplicarse disuelto en agua mediante pulverización foliar o al suelo.

APLICACIONES

WELGRO[®] BORO SG puede aplicarse en una gran variedad de cultivos, tanto arbóreos como herbáceos. La aplicación es más necesaria en zonas o terrenos deficitarios en boro, así como en cultivos muy exigentes en este elemento.

ÉPOCA DE APLICACIÓN Y DOSIS

WELGRO[®] BORO SG se aplica preferentemente en primavera o en períodos de crecimiento activo de las plantas, así como cerca de la floración, ya que favorece la fecundación de la flor (cuajado).

MEZCLAS

WELGRO[®] BORO SG no puede mezclarse con aceites, polisulfuro de cal, SO₄Mn, SO₄Zn, ni productos alcalinos. Para casos especiales consultar.

NOTA IMPORTANTE: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.



CORRETTORE DI CARENZE DI BORO (B)



CARATTERISTICHE

WELGRO[®] BORO SG, a base di sodio pentaborato, è un correttore di carenze di Boro appositamente studiato per prevenire e correggere le carenze di questo elemento. Il prodotto si può applicare una volta sciolto in acqua tramite applicazioni al terreno o applicazioni fogliari.

IMPIEGO

WELGRO[®] BORO SG è impiegabile in sicurezza sia sulle colture arboree che su quelle erbacee ai dosaggi indicati. Il suo impiego è particolarmente raccomandato nelle zone o terreni carenti in boro, così come sulle colture particolarmente esigenti di questo microelemento.

ÉPOCA di IMPIEGO e DOSI

WELGRO[®] BORO SG si impiega preferibilmente in primavera e nei periodi in cui lo sviluppo vegetativo è particolarmente intenso, così come prima della fioritura in modo da favorire la fecondazione dei fiori e l'allegagione.

COMPATIBILITÀ

WELGRO[®] BORO SG non si può mescolare con olio minerale, poltiglie solfocalciche, solfato di manganese, solfato di zinco, prodotti a base di vamidotion ed in generale con prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele particolari, prima dell'impiego consultare il Dipartimento Tecnico.

AVVERTENZE: Le informazioni riportate sono il risultato di studi approfonditi e di sperimentazioni di campo; i risultati delle applicazioni variano in funzione dell'andamento climatico, dello sviluppo vegetativo e dell'epoca di applicazione, fattori indipendenti dalla qualità del prodotto. COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. garantisce la qualità del prodotto e la concentrazione in elementi nutritivi.

NON DISPENDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE.

CORRECTOR DE CARÊNCIAS DE BORO (B)

CARACTERÍSTICAS

WELGRO[®] BORO SG, com base em pentaborato sodico, é um corrector de carências de boro para prevenir ou corrigir as deficiências deste elemento. O produto pode ser aplicado dissolvido em água por via foliar ou no solo.

APLICAÇÕES

WELGRO[®] BORO SG pode ser aplicado em muitas culturas tanto arbóreas como herbáceas. A aplicação torna-se necessária em zonas ou terrenos deficitários em boro e também em culturas exigentes neste elemento.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO E DOSES

WELGRO[®] BORO SG deve ser aplicado preferencialmente na primavera ou em períodos de grande crescimento das plantas e ainda próximo da floração, já que favorece a fecundação da flor (vingamento).

MISTURAS

WELGRO[®] BORO SG não pode ser misturado com óleos, caldas sulfocálcicas, SO₄Mn, SO₄Zn, nem produtos alcalinos. Para casos específicos consultar.

GESTÃO DE EMBALAGENS

Esta embalagem, uma vez vazia depois da utilização do seu conteúdo, é um resíduo perigoso e como tal o utilizador está obrigado a entregá-lo nos pontos de recolha do sistema VALORFITO.

NOTA IMPORTANTE: Os dados aqui presentes foram obtidos mediante profundos estudos e trabalhos de campo; mesmo assim os resultados da sua aplicação variam em função da climatologia, época, etc., factores que escapam ao nosso controlo. COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A garante o conteúdo e a riqueza do produto.

EVITAR A LIBERAÇÃO PARA O AMBIENTE.



ABONO CE. BORATO SÓDICO.



COMPOSICIÓN: Boro (B) soluble en agua 18 % p/p (180 g/kg) en forma de gránulo soluble en agua.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS.
LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



CONCIME CE. BORATO DI SODIO.

COMPOSIZIONE: Boro (B) solubile in acqua 18 %. Granuli solubili in acqua.

DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO.
NON SUPERARE LE DOSE APPROPRIATE.
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO.



ADUBO CE. BORATO DE SÓDIO.

COMPOSIÇÃO: Boro (B) solúvel em água 18% p/p (180 g/Kg) na forma de grânulo solúvel em água.

UTILIZAR APENAS EN CASO DE COMPROVADA NECESSIDADE.
NÃO ULTRAPASSAR AS DOSES RECOMENDADAS.
LER ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso

Partita n°: Vedi su questa confezione

Lote e data de fabrico: Ver impresso no saco



PESO NETO:
PESO NETTO:

5 Kg

WELGRO[®]

BORO SG

ATENCIÓN:

- CONTIENE PENTABORATO SÓDICO.
- Se sospecha que daña al feto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Pida instrucciones especiales antes de usar.
- No manipule la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- Usar el equipo de protección individual obligatorio.
- En caso de exposición manifestada o presunta, consulte a un médico.
- Exclusivo para uso agrícola profesional.

ATTENZIONE:

- CONTIENE SODIO PENTABORATO.
- Sospettato di nuocere al feto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- Esclusivamente per uso agricolo professionale.

ATENÇÃO:

- CONTIENE PENTABORATO SODICO.
- Manter afastado das crianças.
- Suspeito de afectar o nascituro.
- Pedir instruções específicas antes da utilização.
- Não manusear o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
- Usar o equipamento de protecção individual exigido.
- Em caso de exposição ou suspeita de exposição, consulte um médico.
- Exclusivamente para uso agrícola profissional.



CULTIVO CULTURA / CULTURA	DOSIS / DOSE DOSES (g/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN MOMENTO DI APPLICAZIONE / MOMENTO DE APLICAÇÃO
Vid / Vite / Videira	200 - 250	Dos aplicaciones en pre-floración cada 8-10 días / Due interventi in pre fioritura ogni 8-10 giorni / Duas aplicações em pré-floração cada 8-10 dias
Olivo Olivo / Oliveira	200 - 400	20-30 dias antes de la floración 20-30 giorni prima della fioritura / 20-30 dias antes da floração
Frutales de hueso Drupaceae Prunídeas	150 - 250	2-3 tratamientos en pre o post floración; no aplicar en floración Pre e Post Fioritura 2-3 interventi; non applicare il prodotto in fioritura 2-3 tratamentos em pré ou pós floração; não aplicar em floração
Manzana y pera Melo e pero Macieira e pereira	100 - 250	Yemas abiertas / Nel momento "gemme aperte" / Gemas abertas
	150	Floración / In "fioritura" / Floração
	150 - 250	Cuajado y fruto joven Al momento dell' "allegagione" e frutto giovane / Vingamento e fruto jovem
Kiwi / Actinidia / Kiwi	150 - 200	-
Castaño Castagno / Castanheiro	200	Si el producto se aplica al suelo, la dosis a utilizar será 3-5 kg/ha (100 g/árbol) / Nel caso in cui si applichi il prodotto via suolo, le dosi da impiegare sono di 3-5 kg/ha (100 g/pianta) / No caso de aplicação ao solo a dose a utilizar deve ser 3-5 kg/ha (100 g/árvore)
Remolacha Barbabietola Betrerraba	1 kg/ha	2-3 aplicaciones cuando aparezcan las primeras hojas verdaderas 2-3 interventi dalle prime foglie vere / 2-3 aplicações quando apareçam as primeiras folhas verdadeiras
Algodón / Cotone / Algodão	500	Cada 20-30 días / Ogni 20-30 giorni / A cada 20-30 dias
Hortícolas Ortaggi / Hortícolas	150 - 250	Cuando se manifieste la carencia Al manifestarsi la carenza / Quando se manifeste a carência
Fresas y bayas pequeñas Fragola e piccoli frutti Morangueiro e frutos pequenos	150 - 250	Cuando se manifieste la carencia Al manifestarsi la carenza / Quando se manifeste a carência
Flores y plantas ornamentales Fiori e Piante Ornamentali Flores e Plantas Ornamentais	150 - 200	Cuando se manifieste la carencia Al manifestarsi la carenza / Quando se manifeste a carência
Alfalfa / Erba medica / Luzerna	500 (t-2 kg/ha)	Después de cada corte / Dopo ogni taglio / Depois de cada corte
RIEGO POR GOTEO APPLICAZIONI AL TERRENO REGA LOCALIZADA		Aplicar WELGRO [®] BORO SG a dosis de 2-3 kg/ha por aplicación Somministrare WELGRO [®] BORO SG al dosaggio di 2-3 Kg/ha ogni applicazione Aplicar WELGRO [®] BORO SG na dose de 2-3 kg/ha por aplicação

® Marca registrada por COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona.

Producto fabricado y distribuido por / Fabricante:

Distribuido da:

Distribuído por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Vialandem, 321, 5ª - 08029 Barcelona
Email: masso@cqm.es - www.massoagro.com

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
(Succursale Italia)
V.le Fulvio Testi, 59
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 618682218
Fax: +39 02 618682217
Email: info.italia@cqmasso.com

DELEGAÇÃO DE PORTUGAL
Rua da Ajuda, 65 4350-017-Porto
Tel/Fax: +351 225 099 133
Email: portmasso@mail.telepac.pt