



**CONCIME CE, CONCIME NPK 17-30-15 CON:
BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo) E ZINCO (Zn)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE
PER USO ORTICOLO**

WELGRO® STANDARD plus è un concime fogliare altamente concentrato con qualità dimostrata, totalmente solubile. Permette un'apportazione equilibrata di macro e microelementi, necessari per uno sviluppo ottimale della pianta. Il suo alto contenuto in fosforo lo converte in un prodotto particolarmente indicato per la primavera, per favorire la fioritura e la cascola. In seguito si raccomanda di continuare i trattamenti con **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.
Può essere applicato in qualsiasi tipo di coltivazione: olivo, alberi da frutta, agrumi, fragola, vigneti e pergolati di vite, ortaggi, patata, barbabietola da zucchero, cipolla, ornamentali, etc.

DOSE Y MODO D'IMPIEGO

- Ortaggi e fragola: applicare ogni 15 giorni alla dose di 200-250 g/hl fino a fine fioritura (coltivazioni da frutto) o fino alla fine della coltivazione (coltivazioni da foglia commestibile).
- Patata e barbabietola: trattamenti ogni 15 giorni alla dose di 2-3 kg/ha fino all'inizio della tuberizzazione. Dopo, continuare i trattamenti con **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) per incrementare in contenuto di amido/saccarosio.
- Cipolla: realizzare due (2) trattamenti, con polverizzazione normale, mescolandolo con un bagnabile:
 - 1°: nello stadio di tre foglie, alla dose di 1 kg/ha.
 - 2°: all'inizio della formazione del bulbo, alla dose di 1,5 kg/ha.
- Tre settimane dopo il secondo trattamento, applicare **WELGRO® POTASIO** alla dose di 2-3 kg/ha.
- Alberi da frutto e agrumi: realizzare un trattamento dopo la fioritura, alla dose di 200-300 g/hl. Dopo la cascola, trattare con **WELGRO® POTASIO**.
- Olivo: realizzare due (2) trattamenti, aggiungendo un bagnante.
 - 1°: germoglio, alla dose di 0,5-1 kg per 100 litri d'acqua.
 - 2°: all'inizio della fioritura (10% fiore aperto), alla dose di 300-500 g per 100 lts d'acqua.

Dopo la cascola, si raccomanda di realizzare due (2) trattamenti alla dose di 150-250 g/hl (agrumi) con **WELGRO® POTASIO** e 500-1000 g/hl (olivo) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO plus**.

**NON DISPEDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE.
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO.
DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO.
NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.**



**ADUBO NPK 17-30-15 COM MICRONUTRIENTES:
BORO (B), FERRO (Fe), MANGANÉS (Mn), MOLIBDENIO (Mo) E ZINCO (Zn)
ADUBO DE MISTURA
ADUBO PARA APLICAÇÃO FOLIAR NA FORMA DE CRISTAIS SOLÚVEIS EM ÁGUA**

WELGRO® STANDARD plus è un fertilizzante fogliare di alta concentrazione e qualità garantita, totalmente solubile. Permette un fornimento equilibrato di macro e microelementi, necessario per un buon sviluppo della pianta. Il suo alto contenuto in fosforo fa sì che sia un prodotto indicato per utilizzare in Primavera per favorire la fioritura e il vingamento. Nas seguenti applicazioni, si raccomanda di utilizzare **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.
Pode-se aplicar em qualquer cultura: olival, fruteiras, citrinos, morangueiros, vinhas, hortícolas, batata, beterraba, cebolas, ornamentais, etc.

DOSES Y MODO DE EMPREGO

- Hortícolas e morangueiros: aplicar a cada 15 dias na dose de 200-250 g/hl até ao final da floração (culturas de fruto) ou até final da cultura (culturas de folha comestível).
- Batata e beterraba: Tratamentos quinzenais na dose de 2-3 kg/ha até ao início da tuberização. Depois, continuar os tratamentos com **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) para melhorar o conteúdo em amido/sacarose.
- Cebola: Realizar dois (2) tratamentos, em pulverização normal, misturando com molhante:
 - 1°: no estado de três folhas, na dose de 1 kg/ha.
 - 2°: no início da formação do bulbo, na dose de 1,5 kg/ha.
- Três semanas depois do segundo tratamento, aplicar **WELGRO® POTASIO** na dose de 2-3 kg/ha.
- Fruteiras e citrinos: realizar um tratamento depois da floração, a la dose de 200-300 g/hl. Depois do vingamento dos frutos, tratar con **WELGRO® POTASIO**.
- Olival: realizar dois (2) tratamentos, acrescentando um molhante.
 - 1°: brotação, na dose de 0,5-1 kg por 100 litros de água.
 - 2°: no início da floração (10% flor aberta), na dose de 300-500 g por 100 litros de água.

Depois do vingamento, se recomenda realizar dois (2) tratamentos na dose de 150-250 g/hl (citrinos) con **WELGRO® POTASIO** e 500-1000 g/hl (olival) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO plus**.


**LER ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.
A UTILIZAR APENAS EM CASO DE COMPROVADA NECESSIDADE.
NÃO ULTRAPASSAR AS DOSIS RECOMENDADAS.**

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
SUCURSALE ITALIA
V.le Fulvio Testi, 59 - 20092 Cinesello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 61868218 - Fax+39 02 61868217
E-mail: info.italia@cqmasso.com

Distribuido por:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
DELEGAÇÃO DE PORTUGAL
Rua de Ajuda, 65 - 4350-017 Porto
Tel. +351 917 765 356 - Tel./Fax +351 225 099 133
E-mail: portmasso@mail.telepac.pt



WELGRO® STANDARD plus



THE MIRACLE FERTILIZER

Product meets requirements for an EC-FERTILIZER

PESO NETO/PESO NETTO/PESO NETO:

e **5 Kg**



Lote N° y fecha de fabricación:
(ver impreso en la bolsa)

COMPOSICIÓN · COMPOSIZIONE · COMPOSIÇÃO

| | | | |
|--|--|--|---|
| Nitrógeno (N) total Nítrico Amoniacal Ureico | Azoto (N) totale Nítrico Ammoniacale Ureico | Azoto (N) total Nítrico Amoniacal Ureico | 17% p/p 3.3% p/p 5.0% p/p 8.7% p/p |
| Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúble en citrato amónico neutro y en agua | Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solúble en citrato ammonico neutro e in acqua | Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em água | 30% p/p 30% p/p |
| Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúble en agua | Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solúble en acqua | Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em água | 30% p/p 30% p/p |
| Oxido de potasio (K ₂ O) solúble en agua | Ossido di potassio (K ₂ O) solúble en acqua | Oxido de potássio (K ₂ O) solúvel em água | 15% p/p 15% p/p |
| Boro (B) solúble en agua | Boro (B) solúble en acqua | Boro (B) solúvel em água | 0.02% p/p 0.02% p/p |
| Hierro (Fe) solúble en agua | Ferro (Fe) solúble en acqua | Ferro (Fe) solúvel em água | 0.13% p/p 0.13% p/p |
| Hierro (Fe) quelatado con EDTA | Ferro (Fe) quelatado con EDTA | Ferro (Fe) quelatado com EDTA | 0.13% p/p 0.13% p/p |
| Manganeso (Mn) solúble en agua | Manganeso (Mn) solúble en acqua | Manganés (Mn) solúvel em água | 0.05% p/p 0.05% p/p |
| Manganeso (Mn) quelatado con EDTA | Manganeso (Mn) quelatado con EDTA | Manganés (Mn) quelatado com EDTA | 0.05% p/p 0.05% p/p |
| Molibdeno (Mo) solúble en agua | Molibdeno (Mo) solúble en acqua | Molibdénio (Mo) solúvel em água | 0.005% p/p 0.005% p/p |
| Zinc (Zn) solúble en agua | Zinco (Zn) solúble en acqua | Zinco (Zn) solúvel em água | 0.06% p/p 0.06% p/p |
| Zinc (Zn) quelatado con EDTA | Zinco (Zn) quelatado con EDTA | Zinco (Zn) quelatado com EDTA | 0.06% p/p 0.06% p/p |

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3-6.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-6.
Intervalo de pH que garante uma boa estabilidade da porção quelatada: 3-6.



**ABONO NPK 17-30-15 COM MICRONUTRIENTES:
BORO (B), HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)
ABONO DE MEZCLA
ABONO PARA APLICACIÓN FOLIAR EN FORMA DE CRISTALES SOLUBLES EN AGUA**

WELGRO® STANDARD plus es un fertilizante foliar de alta concentración y calidad contrastada, totalmente soluble. Permite un aporte equilibrado de macro y microelementos, necesarios para un buen desarrollo de la planta. Su alto contenido en Fósforo lo convierte en un producto especialmente indicado en primavera, para favorecer la floración y el cuajado. Posteriormente se recomienda continuar los tratamientos con **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.
Puede aplicarse a cualquier tipo de cultivo: olivo, frutales, cítricos, fresales, viñedos y parrales de vid, hortalizas, patata, remolacha, cebollas, ornamentales, etc.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Hortalizas y fresales: aplicar cada 15 días a la dosis de 200-250 g/hl hasta el final de la floración (cultivos con fruto) o hasta el final del cultivo (cultivos de hoja comestible).
- Patata y remolacha: tratamientos quincenales a la dosis de 2-3 kg/ha hasta el inicio de la tuberización. Después, continuar los tratamientos con **WELGRO® POTASIO** (2-3 kg/ha) para mejorar el contenido en almidón/sacarosa.
- Cebolla: realizar dos (2) tratamientos, en pulverización normal, mezclándolo con un mojanete:
 - 1°: en el estadio de tres hojas, a la dosis de 1 kg/ha.
 - 2°: al inicio de la formación del bulbo, a la dosis de 1,5 kg/ha.
- Tres semanas después del segundo tratamiento, aplicar **WELGRO® POTASIO** a la dosis de 2-3 kg/ha.
- Árboles frutales y cítricos: realizar un tratamiento después de la floración, a la dosis de 200-300 g/hl. Después del cuajado, tratar con **WELGRO® POTASIO**.
- Olivo: realizar dos (2) tratamientos, añadiendo un mojanete.
 - 1°: brotación, a la dosis de 0,5-1 kg por 100 litros de agua.
 - 2°: al inicio de la floración (10% flor abierta), a la dosis de 300-500 g por 100 litros de agua.
- Después del cuajado, se recomienda realizar dos (2) tratamientos a la dosis de 150-250 g/hl (cítricos) con **WELGRO® POTASIO** y 500-1000 g/hl (olivo) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO plus**.

**LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD.
NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS.**

© Marca registrada por: **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**, Barcelona

**ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO,
ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO
A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN SIGFITO.**



Fabricante:
Fabricante:
Distribuido en
España por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5° - 08029 Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es
www.massogro.com