SENTO®

ACARICIDA-OVICIDA

PARA EL CONTROL EFICAZ Y PERSISTENTE DE ÁCAROS TETRANÍQUIDOS

Distribuido por:

MASSÓ

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA (España)
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: massoagro@cqm.es - www.massoagro.com

SENTO®

ACARICIDA
OVICIDA

MASSÓ
AGRO DEPARTMENT

MATERIA ACTIVA

CARACTERÍSTICAS

Acaricida-ovicida de contacto y con cierta acción translaminar, pertenece a la familia química de las **TETRAZINAS**.

Actúa sobre los huevos y las larvas neonatas inhibiendo el desarrollo embrionario e interfiriendo el desarrollo celular; en la diferenciación de las fases finales del desarrollo embrionario así como en el desarrollo larvario temprano; también interfiere la síntesis de quitina y la formación de las estructuras respiratorias del embrión. Presenta un largo efecto duradero, lo cual permite bajar la frecuencia de aplicación.

Tiene acción secundaria sobre las primeras formas móviles y jóvenes.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Tetranychus urticae: Araña roja o araña de dos manchas
Tetranychus turkestani: Araña de las fresas
Panonychus citri: Ácaro rojo de los cítricos
Panonychus ulmi: Ácaro rojo de los frutales o europeo
Eriophyes sheldoni: Ácaro de las maravillas
Eriophyes vitis: Eriófido de la vid
Eutetranychus banksi: Ácaro de Téxas
Eutretranychus carpini: Ácaro amarillo
Oligonychus perseae: Araña cristalina del aguacate

Aculus schelechtendali (manzano)
Bryobia rubrioculus
Phyllocoptruta oleivora
Tetranychus cinnabarinus (araña roja)
Tetranychus kanzawai (ácaro rojo del té)
Tetranychus macdanieli
Tetranychus pacificus
Tetranychus viennensis

FORMULADO

CLOFENTEZIN 50% (500 g/l) SC

Es compatible con la mayoría de plaguicidas; en presencia de ácaros adultos **adicionar un acaricida adulticida autorizado compatible**. No mezclar con formulaciones alcalinas.

Hay que tener en cuenta que el producto actúa por contacto, por lo que es necesario es necesario lograr una cobertura completa del cultivo. No trate en horas de calor intenso.

Es un producto cuya formulación es muy estable, se comporta muy bien a la luz y el calor.

CULTIVOS Y DOSIS AUTORIZADAS

Tratamientos acaricidas ovicidas contra araña roja y otros ácaros tetraníquidos en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAZO SEGURIDAD	DOSIS
ALGODONERO	40 días	Utilizar de 0,3 a 1 l/ha
CÍTRICOS	21 días	Se aplicará de 10-20 cc/hl, al inicio del ataque
FRUTALES DE PEPITA, CIRUELO y VID DE VINIFICACIÓN	30 días	Utilizar de 20-60 cc/hl, siendo conveniente aplicar a la eclosión de los huevos de invierno
FRESAL, MELÓN y TOMATE **FRAMBUESO y GROSELLERO**	3 días 7 días	Utilizar de 20-40 cc/hl
PLATANERA	14 días	Se aplicará a 30-40 cc/hl, al inicio del ataque, con un gasto máximo de 1,2 l/ha en una única aplicación por campaña

VENTAJAS

- **Control eficaz y persistente de ácaros tetraníquidos.**
- **Permite los tratamientos tempranos.**
- **Plazos de seguridad acordes con los cultivos.**
- **Perfil toxicológico muy favorable.**
- **Impacto medioambiental muy bajo.**
- **Extraordinario respeto de la fauna beneficiosa.**
  - Completamente compatible con insectos polinizadores: abejas y abejorros.
  - Inocuo para ácaros fitoseidos depredadores, esenciales en citricultura y fruticultura.
  - Inocuo para otros artrópodos depredadores y parasitoides de relevancia en diferentes cultivos.
  - Respetuoso con:

Aphidius matricariae	*Amblyseius spp.*
Cales noacki	*Coccinella septempunctata*
Cryptolaemus montrouzeri	*Crysoperla carnea*
Diglyphhus isaea	*Encarsia formosa*
Euseius stipulatus	*Erecmozerus eremicus*
Macrolophus caliginosus	*Orius sppPhytoseioulus persimilis*
Poecilus cupreus	*Stethorus punctum*
Trichogramma spp.	*Typhlodromus piri/occidentalis*

- **Incluido en todas las principales listas positivas: PI y AENOR.**