

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

FOLPERAN WG

NÚMERO DE REGISTRO

19.994 – Denominación común del producto FOLPAN 80 WDG

COMPOSICIÓN

Folpet 80% p/p (800g/kg)

FORMULACIÓN

Granulo dispersable en agua (WG)

DESCRIPCIÓN

Fungicida Orgánico

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Xn



Nocivo

- Nocivo por inhalación.
- Irrita los ojos.
- Posibles efectos cancerígenos.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrela la etiqueta).

N



Peligroso para el medio ambiente

- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**
- NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas o de los caminos).

PRESENTACIÓN

Saco 5kg

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES AUTORIZADAS

Frutales de pepita: Moniliosis y cicatrización de heridas de granizo.

Cerezo: Chancro, cribado y moniliosis.

Viña de vinificación: Mildiu, botritis, black-rot y cicatrización de heridas de granizo.

Fresales y judías verdes: Antracnosis, botritis, mildiu y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta contra fusarium.

Patata: Alternaria, antracnosis, mildiu y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta contra fusarium.

Lechuga: Alternaria, antracnosis, botritis, mildiu y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta contra fusarium.

Florales y ornamentales: Mildiu, botritis, alternaria, heterosporium, mancha negra del rosal y en tratamientos dirigidos al cuello de la planta, contra fusarium y fialófora.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal, 200 g/hl.

En viñedo y cicatrización de heridas se podrán emplear 250 g/hl.

En cicatrización de heridas, aplicar dentro de los dos días siguientes al granizo.

En viñedo no sobrepasar 1,8 Kg/ha y tratamiento, pudiéndose dar hasta un total de 10 aplicaciones por campaña.

PLAZOS DE SEGURIDAD

- **Fresa, judías verdes y lechuga:** 21 días
- **Uva de vinificación:** 28 días
- **Restantes cultivos de consumo:** 10 días
- **Ornamentales y florales:** No procede por época de aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aceites y respetar un plazo de 2-3 semanas entre ambas aplicaciones.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar el producto en floración. En variedades Golden esperar hasta 6 semanas después de la floración.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.