

Kantarel®

Eficacia completa contra el oidio de la viña y el parral

Dosis de empleo: 30 - 40 cc/hl de agua en pulverización clásica

- Cuando se utilicen máquinas de aplicación de medio o bajo volumen (turbinas o atomizadores) la concentración debe aumentarse de forma que la dosis de producto sea la misma que en las aplicaciones habituales con un alto volumen de agua.
- Para evitar infecciones primarias, es conveniente realizar tratamientos preventivos.
- Utilizar las dosis más altas recomendadas en variedades más sensibles y en periodos de mayor riesgo.

Momento de aplicación



	ESTADO F RACIMO FLORAL VISIBLE	ESTADO H BOTON FLORAL SEPARADO	ESTADO I INICIO FLORACIÓN	ESTADO J CUAJADO GRANO PERDIGÓN	ESTADO K GRANO TAMAÑO GUISANTE
OIDIO	Azufriil® Miclonil®	Kantarel® Orofrex®	Kantarel®	Kantarel® Azufriil®	

1º Tratamiento: Pampanos o brotes con 30 cm. Utilizar 100 -150 cc/Ha.

2º Tratamiento: Inicio de floración. Utilizar 150-250 cc/Ha.

3º Tratamiento: Granos en tamaño perdigón-guisante: 250-400 cc/Ha.

La dosis de producto a utilizar por Ha. es variable en función del número de cepas, tipo de conducción, vigor y desarrollo.

El número de tratamientos dependerá de la sensibilidad varietal, condiciones climáticas favorables para la infección, situación de la parcela y nivel de infección del año anterior.

En caso declarado de ataque de oidio se aconseja utilizar la mezcla: 40 cc/hl de Kantarel® + 400gr/hl de Azufriil® Express.



TRADECORP
DIVISION ESPAÑA

Alcalá, 498 2.ª planta. 28027 MADRID. Tel.: 91 327 29 30. Fax: 91 304 42 00

E-830307-V2

Kantarel®

Penconazol 10% p/v



Para dominar el Oidio de la Vid

TRADECORP
DIVISION ESPAÑA

Kantarel®

Control seguro y eficaz contra el Oidio

Eficacia completa y constante

- Previene y detiene los ataques de oidio sobre las hojas, sarmientos, brotes y racimos de la viña y parral.
- Eficacia al máximo nivel.

Acción sistémica inmediata

- Penetra en el interior de las plantas antes de una hora.
- Se traslada rápidamente a todas las partes de la planta.
- Protege los nuevos crecimientos vegetativos.
- No es lavado por las lluvias posteriores.

Gran acción preventiva y curativa


- **Preventivo:** Impide la instalación del oidio sobre los órganos de la vid, al bloquear el tubo germinativo de la espora.
- **Curativo:** Detiene el desarrollo del micelio durante el periodo de incubación.
- **Actividad anti-esporulante:** Al incidir sobre las fructificaciones del oidio.



Oidio en hoja



Oidio en grano



Oidio en racimo

Kantarel®

Anti-Oidio específico de gran potencia

Gran persistencia de protección: 12-14 días

Seguridad y selectividad:

- Sobre todas las variedades de vid y parral, a la dosis recomendada.
- Seguro para el cultivo a cualquier temperatura ambiental.
- Compatible en mezcla con otros productos.
- Rápida degradación sin dejar residuos.
- No tiene influencia sobre la fermentación de los mostos, cualidades organolépticas de los vinos y alcoholes.
- Producto recomendado en los Programas de Lucha Integrada.

Respetuoso con el medio ambiente y la fauna útil:

- Mantiene el equilibrio ecológico.
- No tiene efectos sobre fauna terrestre ni sobre fauna auxiliar.
- Su aplicación no tiene incidencia sobre ácaros fitofagos.
- Presenta un buen perfil eco-toxicológico.

Plazo de seguridad: 14 días en viña y parral
Clasificación: A - A - A ; Abejas: Compatible
Registro N°: 24.185/16

