

Hoja informativa

Most Micro HL

Herbicida

Composición: Pendimetalina 36,5% p/v (365 g/l)

Formulación: Suspensión de Cápsulas

Envases: 1 litro - 5 litros - 20 litros

Nº Registro: 25.730

CARACTERÍSTICAS

MOST MICRO HL es un herbicida selectivo a base de pendimetalina para aplicación en preemergencia o postemergencia precoz contra malas hierbas anuales.

Malas hierbas gramíneas anuales sensibles:

Alopecurus myosuroides, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Panicum dichotomiflorum*, *Setaria viridis*, *Setaria verticillata*, *Poa annua*.

Malas hierbas anuales de hoja ancha sensibles:

Amaranthus retroflexus, *Amaranthus blitoides*, *Anagallis arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Cardamine hirsuta*, *Chenopodium album*, *Euphorbia* sp., *Polygonum persicaria*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum lapathifolium*, *Bilderdykia convolvulus*, *Portulaca oleracea*, *Solanum nigrum*, *Sonchus oleraceus*, *Stachys annua*, *Stellaria media*, *Urtica urens*, *Veronica hederifolia*, *Veronica persica*, *Viola arvensis*.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Efectuar 1 tratamiento por campaña, aplicándolo al suelo en cultivos al aire libre en pulverización a baja presión en un volumen de caldo de 200 - 400 l/ha, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas, en los siguientes cultivos:

Naranja, limonero y mandarino

Aplicación dirigida entre las líneas del cultivo en preemergencia de las malas hierbas, en primavera u otoño, evitando cualquier contacto con las partes verdes de los árboles.

Vid, manzano, peral, melocotonero, nectarino, cerezo, albaricoquero, almendro, nogal y avellano

Aplicar en pulverización dirigida entre líneas, en preemergencia de las malas hierbas, en invierno, antes del inicio del crecimiento de los brotes.

Tomate, pimiento, lechuga y tabaco

Pretransplante.

Cebolla y ajos

Preemergencia o postemergencia del cultivo (estado de 2-3 hojas).

Zanahoria, patata, girasol, trigo, maíz, judías grano, judías verdes, guisantes y soja

Preemergencia del cultivo.

Algodonero

Presiembra con incorporación o preemergencia del cultivo.

Ornamentales herbáceas

Aplicación dirigida entre las líneas del cultivo en preemergencia de las malas hierbas, en pretransplante en cultivos bien establecidos.

APLICACIONES AUTORIZADAS	PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS)	MALAS HIERBAS	DOSIS
Ajo	n.p	Malas hierbas anuales	1-2,5 (l/ha)
Albaricoquero	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Algodonero	n.p	Malas hierbas anuales	2-3 (l/ha)
Almendro	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Avellano	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Cebolla	n.p	Malas hierbas anuales	1-2,5 (l/ha)
Cerezo	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Girasol	n.p	Malas hierbas anuales	2-3 (l/ha)
Guisantes	n.p	Malas hierbas anuales	1,7-2,5 (l/ha)
Judías para grano	n.p	Malas hierbas anuales	1,7-2,5 (l/ha)
Judías verdes	n.p	Malas hierbas anuales	1,7-2,5 (l/ha)
Lechuga	n.p	Malas hierbas anuales	1,5-2 (l/ha)
Limonero	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Maíz	n.p	Malas hierbas anuales	2-3 (l/ha)
Mandarino	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Melocotonero	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Naranja	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Nectarino	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Nogal	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Ornamentales herbáceas	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Patata	n.p	Malas hierbas anuales	1,7-3 (l/ha)
Peral	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Pimiento	n.p	Malas hierbas anuales	1,25-2,2 (l/ha)
Soja	n.p	Malas hierbas anuales	2-2,5 (l/ha)
Tabaco	n.p	Malas hierbas anuales	1,25-3 (l/ha)
Tomate	n.p	Malas hierbas anuales	1,25-2,2 (l/ha)
Trigo	n.p	Malas hierbas anuales	1,7-3 (l/ha)
Vid	n.p	Malas hierbas anuales	2,5-3 (l/ha)
Zanahoria	n.p	Malas hierbas anuales	2-2,5 (l/ha)

Malas hierbas gramíneas anuales sensibles:

Alopecurus myosuroides, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Panicum dichotomiflorum*, *Setaria viridis*, *Setaria verticillata*, *Poa annua*.

Malas hierbas anuales de hoja ancha sensibles:

Amaranthus retroflexus, *Amaranthus blitoides*, *Anagallis arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Cardamine hirsuta*, *Chenopodium album*, *Euphorbia sp.*, *Polygonum persicaria*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum lapathifolium*, *Bilderdia convolvulus*, *Portulaca oleracea*, *Solanum nigrum*, *Sonchus oleraceus*, *Stachys annua*, *Stellaria media*, *Urtica urens*, *Veronica hederifolia*, *Veronica persica*, *Viola arvensis*.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros hasta las masas de agua superficial.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Most Micro HL Cítricos 2016 (Folleto)
Most Micro HL General 2016 (Folleto)

